

毛。雄蕊4,内藏,后对较短,花丝丝状,花药卵圆形,二室。花柱与雄蕊略等长,先端不等2裂。花盘等大。子房无毛。小坚果卵珠状三棱形,黑褐色。花期5—10月,花后见果。

产云南,广西西部及贵州西部;生于阳性灌丛,路旁,草地及荫蔽和溪边的润湿地上,海拔750—2000米。尼泊尔,印度,斯里兰卡,缅甸,泰国,越南至马来西亚,印度尼西亚也有。模式标本采自尼泊尔。

全草入药,在云南有些地方用于治肾虚、遗精及阳痿,并作为配伍用以治骨折。

2 b. **疏毛变种** 节节香(四川峨眉山),野芝麻(四川汪津),引生草(海南临高),皱面草(海南文昌)

var. **chinensis** Benth in DG Prodr. **12**:525. 1848; Rudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:207. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:923. 1936 — *Leucas mollissima* auct. non Wall.: Benth. Fl. Hongk. 279. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:304. 1890; Henry in Trans. Asiatic Soc. Japan **24**: Suppl. 73. 1896; Diels in Engler. Bot. Jahrb. **29**:555. 1900; Hayata, loc. Pl. Formos. **89**. 1911; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:212. 1912; Matsum. Ind. Pl. Jap. **2**(2):542. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:184. 1915, p. p. 孙雄才,科学社生物所论文集 **7**:234. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:923. 1936, et in Act. Hort. Göthob. **13**:347. 1939 — *Leucas javanica* auct. non Benth.: Hemsl. in l. c. 304. 1890; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **22**:317. 1906; Matsum. in l. c. 542. 1906.

这一变种与原变种不同在于萼齿5长5短,稍尖而长;叶较薄,下面毛较疏。

产湖北,湖南,四川,广东,福建,台湾,广西,贵州及云南;生于干燥的向阳生境,一般分布于低海拔的平地及丘陵地上,在云贵高原海拔可达2700米。模式标本采于广东沿海岛屿。

全草入药,研成粉末,冲开水服,有驱寒发表之功,外用又可以洗疮毒。

## 2 c. **糙叶变种**

var. **scaberula** Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:682. 1885; Mukerj. Lab. Ind. 185. 1940; Murata in Hara Fl. E. Himal. 278. 1966, ibid. 2nd. Rep. 117. 1971, in Act. Phytotax. Geobot. **24**(3):83. 1969.

这一变种与原变种不同在于叶较秃净;萼有刚毛。

产云南南部;生于热带常绿林及灌丛中,海拔500—840米。印度,尼泊尔,锡金,