

缅甸, 泰国也有。等模式标本采自印度。

组 2. 星芮组——Sect. *Astrodon* Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1:61. 1830, et in DG. Prodr. 12:528. 1848.

轮伞花序通常圆球状, 多花。苞片等于或长于花萼。花萼管状, 口部截平而略偏斜, 喉部内面具柔毛, 齿 10, 果时呈星芒状开张。

3. 绣球防风(滇南本草) 拂风草(云南, 据钟观光), 小萝卜、月亮花(云南屏边), 紫药(云南红河), 绣球草、疙瘩草、蜜蜂草(云南腾冲), 抛团、绣球草(云南镇康), 绣球草、蜜蜂草(云南保山), 克服拿补(云南红河哈尼语), 灵继六(四川会东彝语?), 包团草、泡花草(贵州兴义) 图版 83:1—6

Leucas ciliata Benth. in Wall. Cat. n. 2046. 1829, nom. nud.; in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1:60. 1830, Labiat. Gen. et Sp. 614. 1836, et in DG. Prodr. 12:530. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4:687. 1885; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39:463. 1911; Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh 7:72, 246, 314. 1912, 371. 1913; Dunn in ibid. 6:184. 1915; 孙雄才, 科学社生物所论文集 7:234. 1932; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. 9:82. 1934, Symb. Sin. 7:923. 1936; Doan in Léc. Fl. Gén. Indo-Chine 4:1021. 1936; L. P. King etc., Icon. Pl. Medic. e libro Tien-Nan-Pen-Tsao Lanmaoano 1:52—53, pl. 26. 1945; 滇南本草 1:220—221, cum pl. 1959; Murata in Hara Fl. E. Himal. 277. 1966; in ibid. 2nd Rep. 115. 1971——*Phlomis ciliata* Heyne ex Wall. Cat. n. 2046. 1829, nom. nud.

草本, 从纤细须根伸出, 高 30—80 厘米, 有时至 1 米。茎直立, 或上部多扭曲, 纤弱, 通常在上部分枝, 偶有自基部分枝, 钝四棱形, 微具沟槽, 密被贴生或倒向的金黄色长硬毛, 有时在茎基部毛被略脱落。叶卵状披针形或披针形, 长 6—9 厘米, 宽 1—3 厘米, 先端锐尖, 基部宽楔形至近圆形, 有远离的浅锯齿, 纸质, 上面绿色, 下面淡绿色, 上面贴生浅黄色短柔毛, 下面沿脉上密被短柔毛, 余部疏被微柔毛, 明显密布淡黄色腺点, 侧脉 3—5 对, 在上面微凹陷, 下面稍突出; 叶柄长 0.6—1 厘米, 密生金黄色长硬毛。轮伞花序腋生, 少数而远离地着生于枝条的先端, 球形, 径 1.5—2.5 厘米, 多花密集, 其下承以多数密集苞片; 苞片线形, 与萼筒等长或比萼筒长, 边缘较薄, 上面及边缘上具淡黄色长硬毛, 下面无毛。花萼管状, 长约 1 厘米, 先端膨大而略折曲, 外面有刚毛, 下部毛被稀疏或近于无毛, 上部密集, 内面在口部密生柔毛, 脉 10, 明

显, 齿 10, 刺状, 从截平面略偏斜的萼口突然伸长, 在果时呈星状开张, 长约 3 毫米, 外被长硬毛。花冠白色或紫色, 长约 2.8 厘米, 冠筒长约 1 厘米, 与萼筒等长或略伸出萼筒, 外面近喉部具微柔毛, 余部均无毛, 内面在中部以下具略偏斜的须毛状毛环, 冠檐二唇形, 上唇直伸, 盔状, 长圆形, 外面密被金黄色长柔毛, 内面无毛, 下唇较上唇长 1.5 倍, 平展, 3 裂, 中裂片倒梯形, 先端 2 圆裂, 侧裂片卵圆形。雄蕊 4, 内藏, 前对较长, 花丝丝状, 花药卵圆形, 2 室, 室极叉开。花柱丝状, 略与雄蕊等长, 先端极不等 2 裂。花盘平顶, 波状。子房无毛。小坚果卵珠形, 褐色。 花期 7—10 月, 果期 10—11 月。

产云南, 贵州西南部, 四川西南部及广西西部; 本种适应性强, 生于多种生境, 如路旁、溪边、灌丛或草地, 海拔 500—2750 米。尼泊尔, 锡金, 不丹, 印度东北部, 缅甸, 老挝, 越南北部也有。模式标本采自尼泊尔。

根入药, 治肝气郁结, 风湿麻木疼痛, 痢疾, 小儿疳积, 皮疹, 脱肛及虐疾。果入药, 配方治感冒风寒, 亦治小儿肺炎。全草入药, 治疮疡肿毒, 皮疹, 小儿瘦疳攻眼, 花眼青盲, 白翳遮睛, 梅毒, 痢疽发背, 无名肿毒, 癣疥癩及骨折等。在《滇南本草》一书中, 对其药用作如下介绍: “主治杨梅结毒, 痢疽发背, 无名肿毒; 洗癣疮、疥癩良; 其子同地草果为末, 用黑羊肝煎汤, 治小儿疳疾眼眦最效”。

组 3. 斜口组——Sect. *Plagiostoma* Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1:60. 1830, et in DC. Prodr. 12:530. 1848.

轮伞花序圆球状, 多花。苞片与萼等长或稍短于萼。花萼管状钟形、陀螺状或管状, 萼口偏斜, 上方向前伸长。

4. 绉面草(广东海南) 蜂窝草、蜂巢草(广东), 半夜花(广东海南)

Leucas zeylanica (Linn.) R. Br. Prodr. 504. 1810; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1:60. 1830, Labiat. Gen. et Sp. 614. 1836, et in DC. Prodr. 12:531. 1848; Hance in Journ. Bot. Brit. & For. 16:232. 1878; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4:689. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:304. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10:211. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6:184. 1915; Ridley, Fl. Malay. Pen. 2:650. 1923; Merr. in Lingnan Agr. Rev. 2:136. 1925; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:208. 1929; Back. & Bakh. f. Fl. Java 2:623. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore 24:101, f. 17, af. 1969——*Phlomis zeylanica* Linn. Sp. Pl. 596.

