

葶。花萼管状钟形，长 10—12 毫米，外面在齿上被星状微柔毛，脉上被长及短的具节毛茸，全部均被腺毛，齿半圆形或圆形，先端刺状渐尖。花冠粉红色，稀白色，为萼长之 2 倍，冠筒外面无毛，但在喉部以下及其上连同冠檐被具节毛茸，冠檐二唇形，上唇卵形，边缘为锐牙齿状，自内面密被茸毛，下唇中裂片圆肾状心形，侧裂片卵形。后对雄蕊花丝具距状附属器。花柱先端具不等的 2 裂片。小坚果顶端被毛。（标本未见，摘自前人描写）

产新疆南北；生于草地或灌丛中。苏联，蒙古也有。模式标本采自苏联。

12. 甘肃糙苏

Phlomis kansuensis C. Y. Wu in Addenda 595. 1977.

多年生草本。茎高约 36 厘米，钝四棱形，在花序下及节上密被余部疏被向下的具节刚毛。基生叶卵状三角形或卵圆形，长 3—5 厘米，宽 2.8—3.3 厘米，先端圆形或锐尖，基部心形，边缘为深圆齿状或牙齿状，茎生叶一对，卵状披针形，长约 4 厘米，宽约 2 厘米，先端急尖，基部阔楔形，边缘为不整齐的牙齿，苞叶披针形，长约 4.5 厘米，宽约 1.2 厘米，先端渐尖，基部楔形，边缘为不整齐的疏牙齿状，叶片均两面疏被具节刚毛。轮伞花序多花，单个生于茎顶；苞片线状钻形，先端刺状，长 6—10 毫米，疏被具节缘毛。花萼管状钟形，长约 1.4 厘米，宽约 6 毫米，外面脉上疏被具节刚毛，其余部分被尘状微柔毛，齿先端具平展长 4—5.5 毫米的小刺尖，齿间形成二小齿，边缘被微柔毛，端具丛毛。花冠粉红色，长约 1.9 厘米，外面除筒部无毛外被疏柔毛，冠筒内具毛环，冠檐二唇形，上唇长约 9 毫米，外面被疏柔毛，边缘具小齿，自内面密被茸毛，下唇长约 7 毫米，宽约 8 毫米，3 圆裂，中裂片阔倒卵形，较大，侧裂片圆卵形，较小。雄蕊内藏，花丝被微柔毛，后对基部在毛环上有舌状反折的附属器。花柱先端不等的 2 裂。小坚果顶端疏生鳞状毛。花期 6 月。

产甘肃；生于山地草原中，海拔 2600 米。模式标本采自甘肃西固。

13. 串铃草 毛尖茶（河北张北），野洋芋（甘肃盐池）

Phlomis mongolica Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou **24**(2):406. 1851; Fl. Baical. Dahur. **2**(2):434. 1856; Franch. Pl. David. **1**:242. 1884; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:306. 1890; Komarov in Act. Hort. Petrop. **25**:819. 1907; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:216. 1929; Walker in Contr. U. S. Nat. Herb. **28**:657. 1941—*Phlomis tuberosa* auct. non Linn.; Komarov in l. c. 362. 1907; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:187. 1915, p. p., quoad specim. Moelland. et David.; Liu. Chihli Fl. 151. 1928; Ki-