

米,外面被短柔毛,3圆裂,中裂片圆卵形,长约9毫米,宽约7毫米,边缘为不整齐的波状,侧裂片三角形,较小。雄蕊花丝具长毛,无附属器。花柱先端不等的2短裂。小坚果无毛。花期6—7月,果期8—11月。

产山西中部,陕西南部,四川西部及湖北西部;生于冷杉林下或灌丛草坡,海拔2500—4200米。模式标本采自陕西南部。

24 b. 少花变种

var. *pauciflora* G. Y. Wu in Addenda 597. 1977.

这一变种与原变种不同在于叶较狭,轮伞花序少花,具2—7花。

产陕西南部;生于谷地,海拔2400米。模式标本采自陕西佛坪。

25. 美观糙苏

Phlomis ornata G. Y. Wu, 云南植物志 1:609. 图148, 1—4 1976——*Phlomis* sp. nov. Hand. -Mazz. in Act. Hort. Göthob. 9:81. 1934——*Phlomis speciosa* Hand. -Mazz. in l. c. 13:344. 1939, non Salisb. 1796, quod est Leonotis.

25 a. 美观糙苏(原变种) 图版 88:1—4

var. *ornata*

多年生草本;主根粗厚,木质,其上生出多数木质须根;根茎木质,细长。茎多数,常丛生于木质根茎上,基部常具宿存的叶鞘,高40—60厘米,不分枝,直立或上升,四棱形,疏被具节刚毛。茎生叶宽卵圆形,长9—15.5厘米,宽6.5—12.2厘米,先端急尖或渐尖,基部深心形,边缘在基部常为整齐的牙齿状,向先端为圆齿状,牙齿及圆齿均具小突尖,苞叶卵圆形或卵圆状披针形,长6—10厘米,宽3—5厘米,较花序长许多,先端短渐尖,基部浅心形至宽楔形,边缘为锯齿状,叶片均上面橄榄绿色,疏被小刺毛,下面较淡,被较密的小刺毛,有时混生极少星状小刺毛,茎生叶叶柄长2.5—21厘米,通常下部的较长,上部的较短,苞叶叶柄长1—1.5厘米,叶柄均具棱,疏被刺毛。轮伞花序多花,1—2个生于茎端;苞片钻形,长6—13毫米,具中肋,近刺尖,边缘密被小刺毛。花萼管状,长2—2.5厘米,宽约9毫米,带紫色,外面沿脉上被具节刚毛,其余部分被腺微柔毛及星状微柔毛,齿先端微凹,具长3—4毫米的小刺尖,齿间形成二小齿,小齿先端自内面被丛毛,边缘被微柔毛。花冠暗紫色,长约4.7厘米,冠筒长约3.3厘米,外面在背部被白色或带紫色短绒毛,余部近无毛,内面无毛环,冠檐二唇形,外面密被白色或带紫色的绢状短绒毛,内面无毛环,上唇长约1.6厘米,边缘为小齿状,上半部自内面被茸毛,先端尖嘴状,基部两侧近圆形,下唇长约1.7厘米,宽约1.6厘米,3圆裂,中裂片大,扁圆形,基部收缩,长约7毫米,宽约9毫米,边缘