

产福建南部;生于山坡上。模式标本采自福建永福。

1 c. 近无毛变种

var. **subglabrum** C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):158. 1965.

这一变种与原变种不同在于植株矮小,茎高 19 厘米;叶菱形,长 3.8—4.2 厘米,宽 1.5—2.2 厘米,边缘具圆齿状粗齿,两面均被稀疏贴生短硬毛。

产江西中部;生于山坡上。模式标本采自江西吉安。

2. 块根小野芝麻 块根假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)

Galeobdolon tuberiferum (Makino) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2).158. 1965——*Leonurus tuberiferus* Makino in Bot. Mag. Tokyo **19**:146, 190. 1905——*Matsumurella tuberifera* (Makino) Makino in l. c. **29**:279. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:195. 1929——*Lamium tuberiferum* (Makino) Ohwi in Journ. Jap. Bot. **12**:327. 1936——*Lamium chinense* Benth. var. ? *parvifolia* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:303. 1890——*Lamium kelungense* Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:191, t. 12. 1919.

多年生草本,其主根先端膨大成一圆形或长圆形的小块根。茎高 10—20 厘米,细弱,四棱形,具槽,被短刚毛。叶小,卵状菱形,长 1—2 厘米,宽 0.8—1.6 厘米,先端急尖或钝,基部阔楔形,边缘具圆齿状锯齿,草质,上面橄榄绿色,被贴生的白色纤毛状毛茸,下面较淡,被有长短不等的贴生硬毛,叶柄长 5—15 毫米。轮伞花序(2) 4—8 花;苞片叶状,长 5—6 毫米,宽 3—4 毫米,小苞片线形,长约 3 毫米。花萼管状钟形,长约 8 毫米,直径约 2.2 毫米,外面被有刚毛,萼齿三角状披针形,约为萼长之半,先端长渐尖。花冠紫红或淡红色,长 13 毫米,冠筒基部直径 0.6 毫米,喉部宽 4 毫米,内面在中部稍下方具毛环,冠檐二唇形,上唇直立,长圆形,长 6 毫米,外面被长刚毛,下唇长 8 毫米,宽 5 毫米,染有紫色斑点,3 裂,中裂片倒心形,大,侧裂片小,近圆形。雄蕊花丝扁平,无毛,花药深色。花柱丝状,先端近相等 2 浅裂。花盘杯状。子房裂片长圆形,上部被有小鳞片。小坚果褐色,三棱状倒圆锥形,长 2 毫米,宽 1 毫米,先端截形,无毛。花期 4 月,果期 4 月以后。

产台湾,江西,湖南及广西东北部;生于村旁阴湿处及山脚,海拔约 300 米。日本也有。模式标本采自日本。

3. 四川小野芝麻 四川假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)

Galeobdolon szechuanense C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):159. 1965.