

产福建南部;生于山坡上。模式标本采自福建永福。

1 c. 近无毛变种

var. **subglabrum** C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):158. 1965.

这一变种与原变种不同在于植株矮小,茎高 19 厘米;叶菱形,长 3.8—4.2 厘米,宽 1.5—2.2 厘米,边缘具圆齿状粗齿,两面均被稀疏贴生短硬毛。

产江西中部;生于山坡上。模式标本采自江西吉安。

2. 块根小野芝麻 块根假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)

Galeobdolon tuberiferum (Makino) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2).158. 1965——*Leonurus tuberiferus* Makino in Bot. Mag. Tokyo **19**:146, 190. 1905——*Matsumurella tuberifera* (Makino) Makino in l. c. **29**:279. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:195. 1929——*Lamium tuberiferum* (Makino) Ohwi in Journ. Jap. Bot. **12**:327. 1936——*Lamium chinense* Benth. var. ? *parvifolia* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:303. 1890——*Lamium kelungense* Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:191, t. 12. 1919.

多年生草本,其主根先端膨大成一圆形或长圆形的小块根。茎高 10—20 厘米,细弱,四棱形,具槽,被短刚毛。叶小,卵状菱形,长 1—2 厘米,宽 0.8—1.6 厘米,先端急尖或钝,基部阔楔形,边缘具圆齿状锯齿,草质,上面橄榄绿色,被贴生的白色纤毛状毛茸,下面较淡,被有长短不等的贴生硬毛,叶柄长 5—15 毫米。轮伞花序(2) 4—8 花;苞片叶状,长 5—6 毫米,宽 3—4 毫米,小苞片线形,长约 3 毫米。花萼管状钟形,长约 8 毫米,直径约 2.2 毫米,外面被有刚毛,萼齿三角状披针形,约为萼长之半,先端长渐尖。花冠紫红或淡红色,长 13 毫米,冠筒基部直径 0.6 毫米,喉部宽 4 毫米,内面在中部稍下方具毛环,冠檐二唇形,上唇直立,长圆形,长 6 毫米,外面被长刚毛,下唇长 8 毫米,宽 5 毫米,染有紫色斑点,3 裂,中裂片倒心形,大,侧裂片小,近圆形。雄蕊花丝扁平,无毛,花药深色。花柱丝状,先端近相等 2 浅裂。花盘杯状。子房裂片长圆形,上部被有小鳞片。小坚果褐色,三棱状倒圆锥形,长 2 毫米,宽 1 毫米,先端截形,无毛。花期 4 月,果期 4 月以后。

产台湾,江西,湖南及广西东北部;生于村旁阴湿处及山脚,海拔约 300 米。日本也有。模式标本采自日本。

3. 四川小野芝麻 四川假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)

Galeobdolon szechuanense C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):159. 1965.

多年生矮小草本。茎高 8—10 厘米，基部具纤细匍匐枝，四棱形，具细的纵沟纹，被刚毛。叶菱状卵圆形，长 1.7—4.2 厘米，宽 1.1—3 厘米，先端钝，基部阔楔形，边缘具锐粗锯齿，两面脉上疏被贴生疏柔毛；叶柄长 1.5—3.2 厘米，纤细。轮伞花序 2—4 花；苞片极小。花萼管状钟形，长 7—8 毫米，宽约 2 毫米，外面疏被刚毛，萼齿三角状披针形，先端具长约 2 毫米的芒尖。花冠紫红色(?)，长约 1.6 厘米，外面仅上唇疏被疏柔毛，余部近无毛，冠筒直径 1.2 毫米，喉部宽 5 毫米，冠檐 2 唇形，上唇直伸，近长圆形，先端截形而微缺，长约 6.5 毫米，下唇长 6 毫米，宽 7 毫米，3 裂，中裂片圆状倒卵形，侧裂片近圆形。雄蕊花丝扁平，无毛。花柱丝状，先端近相等 2 浅裂。花盘漏斗状。子房裂片近圆形，无毛。小坚果未见。花期 4—5 月。

产四川；生于溪边竹林下，海拔约 640 米。模式标本采自四川北碚。

组 2. 双花组——Sect. *Biflora* C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10** (2): 159. 1965.

草本或灌木；轮伞花序 2 花；花梗短；子房裂片顶端有极少的短硬毛。

4. 阳朔小野芝麻 阳朔假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)

Galeobdolon yangsoense Sun ex C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2): 160, pl. XXXVIII, f. 9—10. 1965.

灌木。茎近圆柱形，被污黄色小刚毛。叶卵圆状长圆形或长圆状披针形，长 4.5—5.5 厘米，宽 2.8—3.6 厘米，先端钝或急尖，基部阔楔形，边缘有稀疏的圆齿状锯齿，齿先端具小突尖，坚纸质，上面深橄榄绿色，中肋上密被且贴生余部疏被疏柔毛，下面较淡，脉上有灰色长柔毛，余部被贴生短硬毛；叶柄长约 6 毫米。轮伞花序 2 花，1—2 个生于长 2.5—6.5 厘米短枝上部；花梗长约 2 厘米。花萼钟形，长约 9 毫米，宽约 5 毫米，外面密被污黄色绒毛，萼齿披针形，为花萼长之半。花冠长 1.6 厘米，外面被短柔毛，上唇背面有较长的贴生丝状毛，内面在花丝基部有疏柔毛毛环，冠筒基部径 1.2 毫米，冠檐二唇形，上唇长约 8 毫米，长圆形，先端微缺，下唇长约 1 厘米，宽约 8 毫米，具明显 3 裂片，中裂片近圆形，基部略收缩，侧裂片较小，近圆形。雄蕊花丝扁平，无毛。花柱丝状，先端相等 2 浅裂。花盘漏斗形，有纵肋。子房裂片顶端有极少的短硬毛。小坚果长圆形，顶端近截形，基部渐狭，扁三棱状，长约 3 毫米，径 1.6 毫米。花、果期 7 月。

产广西；生于灌丛中，海拔约 200 米。模式标本采自广西阳朔。

5. 广东小野芝麻 广东假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)