

..... 2.多毛假水苏 *S. marrubioides* (Regel) Ik.-Gal.

1. 心叶假水苏

Stachyopsis lamiiflora (Rupr.) M. Pop. et Vved. in Trans. Sci. Soc. Turkest. 2:122. 1923; Kupr. in Fl. URSS 21:109. 1954——*Stachys lamiiflora* Rupr. in Mém. Acad. Sci. Petersb. ser. 7, 14:67. 1869.

多年生草本。茎通常单生，直立，高40—80厘米，不分枝，钝四棱形，具倒向短柔毛，老时毛被脱落。叶无柄，茎中部叶长圆状卵圆形，长5—10厘米，宽3—5厘米，先端锐尖，基部圆形至浅心形，边缘具粗大圆齿状锯齿，上面疏被贴生短柔毛，下面毛被亦相同但较稀少，侧脉4—5对，在上面多少凹陷，下面突出；花序上的叶向茎端渐变小，卵圆状披针形，长3—6厘米，宽1—2.5厘米。轮伞花序腋生，多花，花时径达2.5厘米，多数远离组成穗状花序；小苞片柔软，披针状线形至线形，长约1厘米，宽1—1.5毫米，两面被具节柔毛，花梗无。花萼倒圆锥形，连齿长1.1厘米，外面在萼筒上部及萼齿被丝状长柔毛；内面在萼齿处被微柔毛，余皆无毛，10脉，居间脉不甚明显，齿5，等大，长约6毫米，基部长三角形，先端刺状渐尖。花冠浅红色，长16毫米，外面仅于上唇密被白色或黄色长柔毛，内面在冠筒基部1/3有斜向密集柔毛毛环，冠筒长约8毫米，冠檐二唇形，上唇卵圆形，内凹，长8毫米，宽6毫米，下唇开张，近圆形，长8毫米，宽7毫米，3裂，中裂片倒卵圆形至近圆形，长宽约5毫米，先端微缺，侧裂片近圆形，径约3毫米。雄蕊4，前对较长，均延伸至上唇片之下，花丝丝状，扁平，后对被微柔毛，前对无毛，花药卵圆形，2室叉开，边缘具纤毛。花柱丝状，略超出雄蕊，先端相等2浅裂，裂片钻形。花盘平顶，波状。子房棕褐色，无毛。小坚果长圆状三棱形，长4毫米，宽2.5毫米，栗褐色，顶端斜向截平，基部楔形，无毛。花期8月，果期8—9月。

产新疆南部；生于亚高山草甸，海拔2400米。苏联也有。模式标本采自苏联。

2. 多毛假水苏 图版 98:8—10

Stachyopsis marrubioides (Regel) Ik.-Gal. in Bull. Jard. Bot. Acad. Sci. URSS 26:72. 1927; Kupr. in Fl. URSS 21:110. 1954——*Phlomis marrubioides* Regel in Act. Hort. Petrop. 6:375. 1879——*Phlomis oblongata* Schrenk.

图版 98: 1—7. 假水苏 *Stachyopsis oblongata* (Schrenk) M. Pop. et Vved. 1. 植株上部，示花序；2. 小苞片，背面观；3. 花，侧面观；4. 花萼纵剖，内面观；5. 花冠纵剖，内面观，兼示雄蕊；6. 雌蕊；7. 小坚果，侧面观。8—10. 多毛假水苏 *Stachyopsis marrubioides* (Regel) Ik.-Gal. 8. 花萼纵剖，外面观；9. 花萼纵剖，内面观；10. 花冠纵剖，内面观，兼示雄蕊。（曾孝谦绘）