

产新疆阿尔泰山;生于干旱地上。模式标本采自新疆阿尔泰山。

系 2. 短齿系——Ser. Microdontae V. Krecz. et Kupr. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Scient. URSS **15**:363. 1953.

萼齿较短,长 2—3 毫米,前 2 齿稍伸长,宽三角形,短刺尖。

2. 脓疮草 白龙串彩(内蒙古乌审旗,陕西榆林、横山),野芝麻(甘肃平罗)

Panzeria alaschanica Kupr. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Scient. URSS **15**:364, pl. 6. 1953, et in Fl. URSS **21**:158. 1954——*Leonurus lanatus* auct. non (Linn.) Spreng.: Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:83. 1934; Walker in Contr. U. S. Nat. Herb. **28**:656. 1941.

2 a. 脓疮草(原变种) 图版 100:1—4

var. **alaschanica**

多年生草本,具粗大的木质主根。茎从基部发出,高 30—35 厘米,基部近于木质,多分枝,茎、枝四棱形,密被白色短绒毛。叶轮廓为宽卵圆形,宽 3—5 厘米,茎生叶掌状 5 裂,裂片常达基部,狭楔形,宽 2—4 毫米,小裂片线状披针形,苞叶较小,3 深裂,叶片上面由于密被贴生短毛而呈灰白色,下面被有白色紧密的绒毛,叶脉在上面下陷,下面不明显突出,叶柄细长,扁平,被绒毛。轮伞花序多花,多数密集排列成顶生长穗状花序;小苞片钻形,先端刺尖,被绒毛。花萼管状钟形,外面密被绒毛,内面无毛,由于毛被密集而脉不明显,萼筒长约 1.2—1.5 厘米,齿 5,稍不等大,长 2—3 毫米,前 2 齿稍长,宽三角形,先端骤然短刺尖。花冠淡黄或白色,下唇有红条纹,长(30)33—40 毫米,外被丝状长柔毛,内面无毛,冠檐二唇形,上唇直伸,盔状,长圆形,基部收缩,下唇直伸,浅 3 裂,中裂片较大,心形,侧裂片卵圆形。雄蕊 4,前对稍长,花丝丝状,略被微柔毛,花药黄色,卵圆形,2 室,室平行,横裂。花柱丝状,略短于雄蕊,先端相等 2 浅裂。花盘平顶。小坚果卵圆状三棱形,具疣点,顶端圆,长约 3 毫米。花期 7—9 月。

产内蒙古西南部,陕西,宁夏;生于砂地上,海拔 900—1350(—2650?)米。模式标本采自宁夏阿拉善左旗。

全草入药,用以治疮疥。

2 b. 小花变种

var. **minor** G. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **10**(2):165. 1965——*Panzeria alaschanica* Kupr. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Scient. URSS **15**:364. 1953, p. p. min., quoad specimina Ordosicae