

这一变种与原变种不同在于叶分裂较深,裂片较狭,宽不及2毫米,花远较小,长25—(28)毫米。

产内蒙古西南部;生于砂地上,海拔1300米。模式标本采自内蒙古黄河河套区。

3. 甘肃脓疮草

Panzeria kansuensis G. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **10**(2): 165. 1965.

多年生草本。茎多数,多分枝,枝条四棱形,初时密被白色短绒毛,其后多少脱落。茎叶具柄,叶柄长2.5—3.5厘米,扁平,腹面具沟,密被白色短绒毛,叶片轮廓圆形,宽3.5—5厘米,先端钝,基部心形,5裂,裂片约裂达叶片中部,宽楔形,基部宽6—8毫米,其上有1—2对圆齿,最下两侧裂片有多少不规则小裂片,边缘内卷,上面绿色,密被贴生微柔毛,下面灰白色,被紧密的白色绒毛,叶脉在上面下陷,下面不明显。轮伞花序腋生,约10花,多数密集组成顶生穗状花序,下承以少数苞片;苞片线状钻形,扁平,具刺芒状尖头,向上伸,长0.7—1.2厘米,密被绒毛;花梗无。花萼管状钟形,口部张开,不连齿长15毫米,外面密被白色绒毛,内面无毛,脉5,与其间的网脉多少明显,齿5,近等大,长2—3毫米,基部宽三角形,先端骤然短刺尖。花冠白色,长约3.5厘米,冠筒长1.7厘米,外面在上部被丝状疏柔毛,下部无毛,内面在喉部疏被小疏柔毛,冠檐二唇形,上唇直伸,盔状,长圆形,长18毫米,宽6.5毫米,基部收短,外面极密被丝状疏柔毛,内面无毛,下唇直伸,倒卵圆形,长18毫米,宽12毫米,外面被丝状疏柔毛,内面无毛,3裂,中裂片较大,扁倒心形,长5毫米,宽10毫米,先端2浅裂,侧裂片卵圆形,宽4毫米。雄蕊4,前对稍长,均延伸至上唇片之下,花丝丝状,扁平,被微柔毛,花药卵圆形,二室,室平行,横裂。花柱丝状,稍超出上唇片,先端相等2浅裂。花盘平顶。子房无毛。花期10月。

产甘肃中部;生于荒漠草原上,海拔1900米。模式标本采自甘肃古浪。

44. 兔唇花属——*Lagochilus* Bunge

Bunge in Benth. Labiat. Gen. et Sp. 640. 1834——*Chlainanthus* Briq. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**, 3 a: 257. 1896——*Lagochilopsis* Knorr in Nov. Syst. Pl. Vasc. 197. 1966, *syn. nov.*

多年生草本或矮小半灌木;根茎粗厚,木质。茎四棱形,绿白色,坚实,被疏硬毛。叶通常菱形,深裂至羽状深裂,裂片先端通常具刺状尖头稀无刺,叶柄通常在下部的