

点,先端3裂,中裂片大,长约2.5毫米,宽约6.5毫米,分裂成二个三角形的裂片,侧裂片小,三角形。前对雄蕊长仅及上唇唇裂处,后对较短。花盘环状。子房无毛。

产新疆。模式标本采自新疆。

5. 冬青叶兔唇花 图版 102

Lagochilus ilicifolius Bunge in Benth. Labiat. Gen. et Sp. 641. 1834, et in DC. Prodr. 12:515. 1848; Knorr. in Fl. URSS 21:169. 1954.

多年生植物;根木质。茎分枝,铺散,高10—20厘米,基部木质化,干后白绿色,被白色细短硬毛。叶楔状菱形,向上,长约10毫米,宽5—9毫米,先端具3—5齿裂,齿端短芒状刺尖,基部楔形,硬革质,两面无毛,干后白绿色,无柄。轮伞花序具2—4花,生于中部以上的叶腋内;苞片细针状,向上,长约8毫米,无毛,不具花的叶腋内无苞片或稀具针状小苞片。花萼管状钟形,长约12毫米,宽约6毫米,白绿色,硬革质,无毛,齿大小不相等,后一齿较长,长约7毫米,与其相对的齿凹缺长度与之近相等,其余4齿每2齿间的齿凹缺较短,长约5毫米,齿均长圆状披针形,先端有极短刺尖。花冠淡黄色,长2.5—2.7厘米,网脉紫褐色,明显,上唇直立,长1.8厘米,宽约6毫米,先端2裂,外面被白色绵毛,内面被白色糙伏毛,下唇长约1.5厘米,中部宽约1厘米,外面被微毛,内面无毛,3深裂,中裂片大,长7.5毫米,宽1.1厘米,倒心形,先端深凹,侧裂片小,卵圆形,长约4.2毫米,宽约3.5毫米,先端具2齿。雄蕊着生于冠筒基部,后对短,长约2厘米,前对较长,长约2.4厘米,花丝扁平,边缘膜质,基部被微柔毛。花柱近方柱形,先端为相等的2短裂。花盘浅。子房无毛。花期7—9月,果期在9月以后。

产内蒙古,宁夏,甘肃,陕西北部;生于沙地及缓坡半荒漠灌丛中,海拔830—2000米。苏联,蒙古也有。模式标本采自内蒙古。

组2.具刺兔唇花组——Sect. *Spinosi* Fisch et Mey. Enum. Pl. Nov. 28. 1841; Knorr. in Fl. URSS 21:170. 1954.

结实及不结实枝的叶腋内有刺状苞片。

系1.二刺叶兔唇花系——Ser. *Diacanthophylli* Knorr in Fl. URSS 21:170. 1954.

萼齿与萼筒等长,或为其1.5—2倍;花冠超过花萼,为其1.5—3倍;叶片浅裂,具卵圆形或长圆形裂片,先端刺状渐尖,下面被腺毛。

