

6. 二刺叶兔唇花

Lagochilus diacanthophyllus (Pall.) Benth. Labiat. Gen. et Sp. 641. 1834; Fisch. et Mey. Enum. Pl. Nov. 28.1841; Benth. in DG. Prodr. 12:514. 1848; Ledeb. Fl. Ross. 3:432. 1849; Knorr. in Fl. URSS 21:170. 1954——*Moluccella diacanthophyllum* Pall. in Nov. Act. Acad. Sci. Petrop. 10:380, t. 11. 1797.

多年生植物，高 10—30 厘米，具不大的垂直根。茎自基部多少平展分枝，密具叶，被柔毛。下部的叶具柄，柄长 5—10 毫米，上部的多数无柄，叶片宽卵圆形，基部楔状渐狭成短柄，3 分裂，裂片半裂成多数小裂片，小裂片长圆形，先端呈圆形，具短刺尖，上面被刺状毛茸，下面被腺体。轮伞花序约 6 花；苞片白色，锥状渐尖，边缘具稀疏的具节毛茸，长 3—15 毫米。花萼狭管状钟形，喉部微斜，下部被具节毛或无毛，萼齿长圆形，长 9—12 毫米，宽 3—5 毫米，与萼筒等长或为其长 1.5 倍。花冠淡粉红色，上唇外面被短柔毛，边缘被短而柔软的毛茸，先端短缺，裂片椭圆形，下唇中裂片不深地弯缺，中裂片有二个宽倒卵圆形的小裂片，侧裂片长圆形。小坚果顶端具腺点。花期 6 月。（未见标本，摘自前人描写）

产新疆北部；生于山麓平原砾石土壤上。苏联也有。模式标本采自苏联。

7. 光刺兔唇花

Lagochilus leiacanthus Fisch. et Mey. Enum. Pl. Nov. 29.1841; Benth. in DG. Prodr. 12:514.1848; Ledeb. Fl. Ross. 3:432.1849; Knorr. in Fl. URSS 21:171.1954——*Lagochilus diacanthophyllum* auct. non (Pall.) Benth.: Bong et Mey. Verz. am Saissang-Nor gesammelten Pfl. 55.1841.

多年生植物，高 15—25 厘米；根粗厚，垂直。茎多少直立，自基部多叶，被不十分密的短而向下的毛茸。叶菱形，基部楔形，三出 5 浅裂，裂片分裂成卵状长圆形的小裂片，先端刺状渐尖，具长 1.5—2 毫米的小刺尖，叶片上面无毛或被稀疏的小刺状毛茸，下面被具腺疏柔毛，叶柄长 3—5 毫米或无柄。轮伞花序约 6 花；苞片长 4—12 毫米，锥状，无毛。花萼管状钟形，无毛。萼齿长圆形，先端圆，长 8—12 毫米，宽 4 毫米，具长 1—1.5 毫米的小刺尖，与萼筒等长或为其 1.5—2 倍。花冠粉红色，为萼长的 2.5—3 倍，上唇半裂成 2 长圆形的裂片，外面被柔毛，下唇 3 浅裂，中裂片微缺，小裂片卵圆形，侧裂片短，长圆形。花期 6—8 月。（标本未见，摘自前人描写）

产新疆南、北部；生于砾石山坡上。苏联也有。模式标本采自苏联。

8. 毛节兔唇花 图版 103:1—5