

Lagochilus chingii D. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10**(3):219, pl. XLII, f. 10—11. 1965.

多年生植物。茎高 14—24 厘米，四棱形，白色，下部被稀疏的平展的长硬毛，上部被小刚毛。叶阔菱形，长宽 1.5—2 厘米，上面被小刚毛，下面有透明腺点，近无柄，二回羽状三深裂，裂片长圆形或倒卵圆形，具小裂片，先端具小刺尖。轮伞花序具 4 花；苞片钻形至针状，长 4—10 毫米。花萼管状钟形，长约 17 毫米，宽 4 毫米，除萼齿边缘有短睫毛外余部近无毛，萼齿长圆形，先端钝，具小突尖，极不等长，前 2 齿长约 7 毫米，宽 2.5—3 毫米，后 3 齿长 6.5—8.5 毫米，宽 2—3 毫米。花冠约为萼长的 1.5 倍，外面散布透明腺点及被疏柔毛，内面疏被短柔毛，近基部有疏柔毛毛环，上唇直立，长约 13 毫米，边缘被长柔毛，先端具 4 齿，下唇略短，3 裂，中裂片倒心形，长 4 毫米，宽至 8 毫米，先端具深凹，侧裂片狭长圆形，先端钝。前对雄蕊长约 11 毫米，后对雄蕊较短，长约 7 毫米，花丝扁平，边缘膜质，无毛，花药略被疏柔毛。花柱较粗，与后对雄蕊等长，无毛，先端近相等 2 浅裂。花盘浅杯状。子房顶端截形，有白色小突起。小坚果未见。 花期 8 月。

产新疆北部；生于半荒漠砂砾质的戈壁滩上，海拔约 1100 米。模式标本采自新疆富蕴。

系 3. 大齿兔唇花系——Ser. Macrodoni Knorr. in Fl. URSS **21**:179. 1954.

萼齿宽卵圆形、椭圆形或宽三角形，与萼筒等长或较之为短。

12. 宽齿兔唇花 图版 101:14—16

Lagochilus iliensis C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10**(3):219, pl. XLI, f. 14—16. 1965.

多年生植物。茎高约 30 厘米，自基部分枝，钝四棱形，白色，疏被小刚毛，下部近无毛。叶菱状三角形，长 2.2—3 厘米，宽 2.1—3 厘米，革质，上面被稀疏的小刚毛，下面除密被小刚毛外并密布腺点，基部骤然渐狭成具翅的短柄，柄长 2—4 毫米，叶片羽状深裂，通常下部的一对裂片 3 深裂或羽状深裂，裂片及小裂片卵圆形至长圆形，先端圆形，具小刺尖。轮伞花序？花；苞片钻形，水平伸出或微下倾，中肋显著，长 8—15 毫米，上部的被平展具节刚毛，下部的毛脱落。花萼狭钟形，长约 1.9 厘米，直径约 7 毫米，萼齿宽卵圆形，长约 6 毫米，宽 4.5—5.5 毫米，网脉明显，先端圆形，具短小刺尖，萼筒被较密而平展的、具节长柔毛及混生的小刚毛。花冠及雌雄蕊未见。

产新疆北部；生于坡地上，海拔 1900 米。模式标本采自新疆伊犁。

