

13. 阔刺兔唇花

Lagochilus platyacanthus Rupr. in Mem. Acad. Sci. St. Petersburg. ser. 7, 14:68. 1869; Knorr. in Fl. URSS 21:180. 1954 — *Lagochilus affinis* Rupr. in l. c.

多年生植物，高 15—25 厘米。茎被糙伏毛。叶三出，羽状分裂，具线形或卵圆形的小裂片，边缘具小缘毛，先端渐尖，下部的叶片菱形，上部的圆形，均具长 5—17 毫米长的柄。轮伞花序 4—8 花；苞片长 7—12 毫米，披针形，锐利，具明显的肋，锐刺状，密被具 2—5 节的毛茸及具柄头状腺体。花萼被具 2—3 节的紧密绒毛状毛被和无柄头状腺体，萼齿卵圆形，先端几三角形，长 6—7 毫米，宽 4—5 毫米，与萼筒等长或比萼筒短。花冠长为花萼的 2 倍，上唇 2—3 深裂，具披针形裂片，下唇中裂片短缺，分成 2 圆形的裂片，侧裂片长圆形。花期 6—7 月。（标本未见，摘自前人描写）

产新疆南部；生于碎石坡灌丛中。苏联也有。模式标本采自天山。

14. 喀什兔唇花

Lagochilus kaschgaricus Rupr. in Mem. Acad. Sci. St. Petersburg. ser. 7, 14:67. 1869; Knorr. in Fl. URSS 21:181. 1954.

多年生植物，高 15—19 厘米。茎多数，无毛，灰白色，仅上部被短柔毛，开展，具多数死枝条。叶阔菱形，羽状深裂，基部渐狭成短而宽的叶柄，无毛，稀被疏毛茸，具长圆形裂片，先端钝或具小刺尖，小刺尖长 1—1.5 毫米，边缘卷曲，具小缘毛。轮伞花序约 4—6 花，苞片粗，锥刺状，平展，长 15—23 毫米，无毛。花萼管状钟形，萼筒被稀疏的糙伏毛或下部较密，萼齿阔卵圆形，长 6—8 毫米，宽 5 毫米，为萼长之半或不及一半，先端斜截形，具长 1 毫米的小刺尖。花冠为萼长之 2 倍，粉红色，上唇比下唇长许多，先端深缺，呈 2 牙齿状裂片，下唇 3 浅裂，中裂片短缺成 2 短齿状裂片，侧裂片长圆形，先端具齿。花期 7—9 月。（标本未见，摘自前人描写）

产新疆南部；生于干旱碎石坡上。苏联也有。模式标本采自天山。

45. 绵参属——*Eriophyton* Benth.

Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1:63. 1830.

矮小多年生具肥厚柱状根的草本，全体出土部分被有绵毛。叶正常时为菱形或近圆形，但有时下部茎叶退化成苞片状。轮伞花序通常 6 花，密集，或有下部者远离；小苞片刺状；花梗无。花萼宽钟形，膜质，近透明，具 10 脉，齿 5，近等大，三角形，先端