

部楔形、圆形、截形至心形，边缘为粗大的锯齿状牙齿，膜质，上面绿色，疏被短刺毛，下面淡绿色，极疏被短刺毛，明显的具细点，侧脉 2—4 对，两面明显，下面尤为突出，其间细脉网结，叶柄长 1—6 厘米，纤细，疏被微柔毛或近于无毛。轮伞花序有时在每叶腋内为单花，但常具 3—6 花；小苞片钻形，长约 2 毫米；花梗短，长不及 1 毫米。花萼长 1—1.5 厘米，管状，外面在脉上有细刺毛，余部有细点而近于无毛，内面无毛，脉 8，后 3 齿 2 居间脉消失，显著，齿 5，比萼筒短，长三角形或卵圆形，二唇状，前 2 齿靠合，比后 3 齿长，后 3 齿近等大，齿端为刺尖。花冠玫瑰红、紫或深紫至暗红色，长约 1.5(2) 厘米，外微被细柔毛，内面近基部处有微柔毛环，其上疏被秕鳞，冠筒细管状，向上伸展，冠檐二唇形，上唇长圆状椭圆形，长约 5 毫米，全缘，下唇开张，3 裂，中裂片稍大，长圆形，先端微缺，侧裂片近圆形。雄蕊 4，均延伸至上唇片之下，前对较长，均插生于花冠喉部，花丝扁平，被微柔毛，花药卵圆形，二室，室极叉开。花柱细长，略伸出上唇，顶端相等 2 浅裂。花盘平顶，果时伸长。小坚果卵状三棱形，腹面具棱，栗褐色。花期 7—8 月，果期 9 月。

产湖北，四川，贵州，云南东北部，陕西南部，甘肃东部，河南西部及河北西南部；生于林下沟谷中，潮湿处，海拔 1200—2700 米。等模式标本采自湖北兴山、房县及四川巫山。

2b 十脉变种

var **decemnervius** C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax Sin. 10(3): 220. 1965——*Loxocalyx urticifolius* auct. non Hemsl.; C. Y. Wu in Act. Phytotax Sin. 8(1): 33. 1959, p. p. min.

这一变种与原变种不同在于茎、幼枝疏生但在节上密生倒向具节疏柔毛状糙硬毛；轮伞花序少花(2—6 花)；花萼 10 脉，脉上明显被具节糙硬毛，居间脉均明显，前 2 齿高度靠合且极增大，后 3 齿常不等大，中央 1 齿十分伸长；花冠大，长 1.5—3 厘米，下唇中裂片倒心形。

产陕西南部；生于山坡路旁，海拔 1500—2300 米。模式标本采自陕西佛坪。

47. 假野芝麻属——*Paralamium* Dunn

Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 8: 168. 1913.

多年生直立草本。叶宽大，具齿。总状圆锥花序腋生或顶生，由密集的聚伞花序组成；花梗短小；苞片及小苞片极微小。花萼钟形，膜质，10 脉，果时极为明显，齿 5，最后一齿最大，顶端平截，果时明显自两侧边缘外卷，其余 4 齿披针形，前 2 齿稍大，果

时花萼增大。花冠筒伸长,细弱;喉部增大,外疏被微柔毛,内面无毛环,但被倒向短柔毛,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,稍内凹,下唇开张,3裂,中裂片较大,全缘。雄蕊4,前对较长均延伸至上唇片之下,平行靠近,借小缘毛而连接,花药卵圆形,2室,室汇合,极叉开。花柱先端不相等2浅裂。花盘平顶。小坚果扁球状三角形,细小,有光泽及小窝孔,光滑。

单种属,产越南,缅甸及我国云南。

1. 假野芝麻 假芝麻(中国种子植物科属辞典) 图版 106

Paralamium gracile Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:168.1913, **6**:183.1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:203.1929.

草本,高40—80厘米。茎直立,钝四棱形,密被小硬毛,其间混杂有平展的具节刚毛。叶卵圆状心形,长9—17厘米,宽4—10厘米,先端渐尖,基部心形,边缘有细圆锯齿,纸质,上面满布小硬毛,其间杂有其节刚毛,下面除脉上密生具节刚毛外,余皆疏生小硬毛,明显具腺点,侧脉5—6对,上面不显著,下面突出,叶柄长2—10厘米,通常为叶片长1/3,扁平,柔弱,毛被如同茎部。总状圆锥花序腋生或顶生,腋生时单出,顶生时三出,长7—30厘米,顶生者最长,开花时径1.5—2厘米,由多数细小的聚伞花序组成;聚伞花序沿序轴密集,无梗,具1—5花,其下承以钻形细小苞片;花梗长约1毫米,果时伸长达2毫米,其下有一细小钻形的小苞片;序轴及花梗的毛被同茎部。花萼钟形,长3毫米,外被微柔毛及腺点,内面在喉部有横列长刺毛,其间夹有腺点,余部无毛,萼筒长约2毫米,10脉,多少显著,齿5,后一齿最大,宽卵圆形,顶端平截,其余4齿披针形,急尖,而前2齿稍大,果时花萼增大,外面近于无毛,脉纹显著,后一齿自两侧边缘外卷。花冠长约9毫米,细小,唇片紫色,筒部白色,外疏被微柔毛,内面在冠筒有倒向短柔毛,冠筒纤细,伸出萼筒很多,喉部增大,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,下唇开张,3裂,中裂片近圆形,全缘,侧裂片卵圆形。小坚果,长约1毫米,黑色。花期4月,果期4—5月。

产云南东南部及西南部;生于水沟旁或林中潮湿处,海拔1150—1800米。越南,缅甸也有。模式标本采自云南蒙自东南方的山地林中。

48. 假糙苏属——*Paraphlomis* Prain

Prain in Ann. Bot. Gard. Calcutta **9**:60. 1901.

草本或半灌木,具根茎;根茎匍匐,斜行,密生须根。茎上升或直立,常下部伏地。叶膜质、薄纸质、坚纸质至近革质,边缘具齿,无柄或具长柄。轮伞花序多花至少花,