

时花萼增大。花冠筒伸长,细弱;喉部增大,外疏被微柔毛,内面无毛环,但被倒向短柔毛,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,稍内凹,下唇开张,3裂,中裂片较大,全缘。雄蕊4,前对较长均延伸至上唇片之下,平行靠近,借小缘毛而连接,花药卵圆形,2室,室汇合,极叉开。花柱先端不相等2浅裂。花盘平顶。小坚果扁球状三角形,细小,有光泽及小窝孔,光滑。

单种属,产越南,缅甸及我国云南。

1. 假野芝麻 假芝麻(中国种子植物科属辞典) 图版 106

Paralamium gracile Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:168.1913, **6**:183.1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:203.1929.

草本,高40—80厘米。茎直立,钝四棱形,密被小硬毛,其间混杂有平展的具节刚毛。叶卵圆状心形,长9—17厘米,宽4—10厘米,先端渐尖,基部心形,边缘有细圆锯齿,纸质,上面满布小硬毛,其间杂有其节刚毛,下面除脉上密生具节刚毛外,余皆疏生小硬毛,明显具腺点,侧脉5—6对,上面不显著,下面突出,叶柄长2—10厘米,通常为叶片长1/3,扁平,柔弱,毛被如同茎部。总状圆锥花序腋生或顶生,腋生时单出,顶生时三出,长7—30厘米,顶生者最长,开花时径1.5—2厘米,由多数细小的聚伞花序组成;聚伞花序沿序轴密集,无梗,具1—5花,其下承以钻形细小苞片;花梗长约1毫米,果时伸长达2毫米,其下有一细小钻形的小苞片;序轴及花梗的毛被同茎部。花萼钟形,长3毫米,外被微柔毛及腺点,内面在喉部有横列长刺毛,其间夹有腺点,余部无毛,萼筒长约2毫米,10脉,多少显著,齿5,后一齿最大,宽卵圆形,顶端平截,其余4齿披针形,急尖,而前2齿稍大,果时花萼增大,外面近于无毛,脉纹显著,后一齿自两侧边缘外卷。花冠长约9毫米,细小,唇片紫色,筒部白色,外疏被微柔毛,内面在冠筒有倒向短柔毛,冠筒纤细,伸出萼筒很多,喉部增大,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,下唇开张,3裂,中裂片近圆形,全缘,侧裂片卵圆形。小坚果,长约1毫米,黑色。花期4月,果期4—5月。

产云南东南部及西南部;生于水沟旁或林中潮湿处,海拔1150—1800米。越南,缅甸也有。模式标本采自云南蒙自东南方的山地林中。

48. 假糙苏属——*Paraphlomis* Prain

Prain in Ann. Bot. Gard. Calcutta **9**:60. 1901.

草本或半灌木,具根茎;根茎匍匐,斜行,密生须根。茎上升或直立,常下部伏地。叶膜质、薄纸质、坚纸质至近革质,边缘具齿,无柄或具长柄。轮伞花序多花至少花,

