

先端近相等 2 浅裂。子房紫黑色，顶端截平，中央稍凹陷，无毛。小坚果倒卵珠状三棱形，顶端钝圆，黑色，无毛。花期 6—8 月，果期 8—12 月。

产云南东南部、南部及西南部，广西西南部，广东海南，台湾；生于热带林荫下，海拔 320—1350(—2500?) 米。印度，巴基斯坦，缅甸，泰国，老挝，越南经马来西亚至印度尼西亚及菲律宾也有。模式标本采自印度尼西亚的爪哇。

1 b. **小叶变种** 玖檀花(广西忻城)，十二槐花(贵州兴义)，壶瓶花，荇子香(贵州惠水)，金槐(贵州安龙)

var. **coronata** (Vaniot) G. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **13** (1):72.1975——*Lamium?* *coronatum* Vaniot in Bull. Acad. Géogr. Bot. **14**:174, 1904; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**:462. 1911——*Paraphlomis rugosa* (Benth.) Prain var. *coronata* (Vaniot) G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):38. 1959; H. W. Li in ibid. **10**(1):61. 1965 —— *Loxocalyx vaniotiana* Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. **9**:224. 1911——*Lamium gesneroides* Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:92.1919——*Phlomis rugosa* auct. non Benth.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:306.1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**:212.1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**:168—9. 1913, **6**:186. 1915, excl. specim. Yunnan.——*Paraphlomis albiflora* auct. non Hemsl.: 孙雄才, 科学社生物所论文集 **7**:238.1932——*Paraphlomis rugosa* auct. plurimum, quoad specim. subtrop., non (Benth.) Prain.

这一变种与原变种不同在于叶远较小，一般长 3—9 厘米(有时达 15 厘米)，宽 1.5—6 厘米，肉质，边缘疏生锯齿或有小尖突的圆齿，齿常不明显或极浅。

产云南东南部，四川，贵州，广西，广东，湖南，江西及台湾；生于亚热带常绿林或混交林的林荫下，海拔 400—2400 米。模式标本采自贵州安平附近。

广西、贵州用全草入药，云有润肺止咳、补血调经之效。

1 c. **狭叶变种** 鬼灯笼树(广东海南)，土结香(四川峨眉)

var. **angustifolia** (G. Y. Wu) G. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **13**(1):73.1975——*Paraphlomis rugosa* (Benth.) Prain var. *angustifolia* G. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1):38.1959; H. W. Li in ibid. **10**(1):61.1965.

这一变种与原变种不同在于叶卵圆状披针形直至狭长披针形，具极不显著的细圆齿；萼齿尖明显针状，具细刚毛。

产云南，四川，贵州，广西，广东，福建及湖南；生于亚热带常绿林或混交林林荫