

上部具叶。叶卵圆形、卵状圆形或近圆形，长10—12厘米，宽6—8厘米，先端锐尖，基部宽楔形、近圆形或微心形，边缘有不规则的具胼胝尖的圆齿，坚纸质，上面黄绿色，下面灰绿色，上面满布下面沿脉上被污黄色具节小刺毛，下面在脉间满布金黄色腺点，侧脉4对，上面稍凹陷，下面隆起，叶柄纤细，长3.5—9厘米，扁平，具狭翅，疏被污黄色具节小刺毛。轮伞花序10—18花，有时上部者具2花，轮廓近圆球形，花未开放时径2.5厘米，基部承以少数苞片；苞片线形，长2—7毫米，宽0.75毫米，外面被具节小刺毛，内面无毛；花梗极短或近无梗。花萼管状，连齿长1—1.2厘米，坚纸质，外面沿脉上被污黄色具节小刺毛，内面在喉部及齿上被微柔毛，明显10脉，齿5，狭三角形，长3毫米，宽1.25毫米，先端刺状渐尖。花冠白色或在喉部有小紫斑，长1.8厘米，冠筒直立，圆柱状，等宽或在喉部微增大，外面疏被疏柔毛，内面在中部下方有斜向毛环，冠檐二唇形，上唇长圆形，稍内凹，全缘，外面密被疏柔毛，内面无毛，下唇3裂，中裂片最大，倒梯形，边缘波状，外面在中部被疏柔毛，余部无毛，内面无毛，侧裂片卵圆形。雄蕊4，前对较长，花丝丝状，略被髯毛，插生于花冠喉部，花药长圆形，2室，室平行或略叉开。花柱丝状，先端不等2浅裂。子房顶端截平，无毛。花期6—7月。

产广西东北部及东南部；生于密林下草丛中，溪旁，砂岩潮湿地上，海拔500—800米。模式标本采自广西。

8. 白花假糙苏 四轮麻(四川忠县)

Paraphlomis albiflora (Hemsl.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. **13**: 347.1939; Y. Z. Sun in Act. Phytotax. Sin. **4**(1):49.1955, excl. syn. *Paraphlomis albida* Hand.-Mazz. var. *brevidens* Hand.-Mazz.; C. Y. Wu in ibid. **8**(1):36. 1959; H. W. Li in ibid. **10** (1):65.1959——*Phlomis albiflora* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:304.1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:185.1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:217.1929——*Paraphlomis hirsuta* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:922.1936.

8 a. 白花假糙苏(原变种) 图版108

var. **albiflora**

图版108: 白花假糙苏 (原变体) **Paraphlomis albiflora** (Hemsl.) Hand.-Mazz. var. **albiflora**, 1.花枝一部分; 2.花, 侧面观; 3.花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 4.花萼纵剖, 外面观; 5.花萼纵剖, 内面观; 6.雌蕊; 7.小苞片; 8.茎上毛被; 9.花萼外面毛被; 10.花萼内面上部毛被; 11.叶上面毛被; 12.叶背面毛被。(王利生绘)