

exclud.; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 10(1):67.1965.

直立,多年生草本。茎高达50厘米,不分枝,稀有分枝,红紫色,钝四棱形,具深沟槽,基部无毛,上部被微柔毛。叶卵圆状披针形至披针形,长8—16厘米,宽3—5厘米,上面绿色,被长硬毛,下面灰绿色,被细小微柔毛,先端长渐尖,基部楔形,下延至叶柄中部以上,边缘具粗糙牙齿状锯齿;叶柄长1—4厘米,在枝条上部者逐渐变短。轮伞花序腋生,远离,多花(在10花以上)。花长18—19.5毫米,灰黄色。花萼管状,长9.5毫米,外被微柔毛,内面无毛,萼筒长7.2毫米,10脉,明显,齿5,长三角形,长2.3毫米,宽1.8毫米,先端锐尖。花冠管状,长17.5毫米,外面密被长柔毛,内面近无毛,冠筒长11.5毫米,内面离基部约2毫米处有明显疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长6毫米,宽3.5毫米,直伸,几扁平,全缘,下唇轮廓宽倒卵形,长6毫米,宽7毫米,3裂,中裂片倒心形,长3毫米,宽2.6毫米,先端微缺,侧裂片宽椭圆形,长2.2毫米,宽1.9毫米,全缘。雄蕊4,内藏,均上升至上唇之下,后对较短,长约4毫米,前对较长,长6毫米,花丝被疏柔毛,花药2室,室略叉开。花盘基生,平頂。子房分裂,无毛,截头。花柱长15毫米,内藏,先端不相等2裂,裂片钻形,上裂片稍短。小坚果黑褐色,三棱形,截头,基部楔形,光滑,长2毫米,宽0.9毫米。花期6月。(标本未见,摘自原描写)

产浙江南部;生于阴坡上。模式标本采自浙江云和。

14. 折齿假糙苏 野芝麻(江西修水)

Paraphlomis reflexa G. Y. Wu et H. W. Li in Addenda 602.1977.

多年生草本;根茎斜行,其上有密集丛生纤维状须根。茎直立,高0.5—1米,钝四棱形,具细条纹,上部具四浅槽,下部几无槽,基部有不定根,全长极密被淡黄或灰白绒毛,但老时茎下部毛被渐脱落,不分枝,茎上部节间长2.5—8厘米,比叶片短很多。叶宽卵圆形,长12—14厘米,宽6.5—9.5厘米,先端短尖,基部宽楔形至近圆形,边缘在基部以上具粗大圆齿状牙齿,齿尖具胼胝体,坚纸质,上面绿色,沿脉上稍密被余部极疏被短柔毛,下面淡黄或灰白色,极密被绒毛,侧脉6—8对,与中脉在上面稍明显而下面却十分隆起;叶柄长1—2.5厘米,腹凹背凸,被毛同茎。轮伞花序生于茎上部叶腋内,疏离,(2)4—10花,其下承以少数针状小苞片;小苞片长约1毫米,密被短柔毛;花梗短,长1—2毫米。花萼倒圆锥形,长1.1厘米,外面密被短柔毛,内面在齿上被短柔毛余部无毛,明显10脉,萼齿5,三角状钻形,长约3毫米,基部宽1.5毫米,先端锥状长渐尖,花后明显外反。花冠干时紫黑色,长约1.4厘米,冠筒长约8毫米,基部宽约1.5毫米,近等粗,至喉部稍扩大,外面在下部无毛余部密被灰白色短柔

毛,内面在离基部2.5—3毫米处有斜向的小疏柔毛毛环,冠檐外面全面内面仅在下唇中央密被灰白色短柔毛,二唇形,上唇长圆形,长约6毫米,宽约2毫米,稍内凹,下唇斜展,长5.5毫米,宽5毫米,3浅裂,中裂片稍宽,宽约2毫米,侧裂片宽1.5毫米,裂片边缘均全缘。雄蕊4,前对稍长,花丝扁平,被小纤毛,花药2室,室平行。花柱纤细,不超出雄蕊,先端近相等2浅裂。花盘环状。小坚果三棱状长圆形,长2毫米,宽1.2毫米,腹面具棱,顶端圆形,基部宽楔形,褐色,无毛。花期8月,果期9月。

产江西西北部;生于山坡路旁。模式标本采自江西修水。

系2.纤细假糙苏系——Ser. *Graciles* C. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **10**(1):67.1965.

萼齿宽三角形至宽卵圆状三角形,先端钻形,渐尖至短尖。

15. 纤细假糙苏

Paraphlomis gracilis Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:210. 1929; Sasaki, Cat. Governm. Herb. 443.1930; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:922. 1936; Masam. Short Fl. Formosa 185.1936; Y. Z. Sun in Act. Phytotax. Sin. **4**(1):50.1955, p. p. quoad specimen Hupeh.; C. Y. Wu in ibid. **8**(1):34.1959, specimine taiwanense excluso.; H. W. Li in ibid. **10**(1):68.1965——*Phlomis gracilis* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:35.1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:186.1915, non Salisb. 1794, quod est *Leucas zeylanica* (Linn.) R. Br.——? *Ajuga formosana* Hayata in Matsum. et Hayata Enum. Pl. Formos. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **22**:318.1906, et in Fedde, Repert. Sp. Nov. **6**:197. 1908—1909——? *Lamium formosanum* Nakai ex Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos. 98.1917; Hayata, Icon. Pl. Formos. **8**:90.1919.

15 a. 纤细假糙苏 (原变种)

var. *gracilis*

草本,从纤细须根直立,具匍匐枝。茎高约1米,四棱形,具槽,坚硬而纤细,被有倒向的糙伏毛,不分枝或于上部少分枝,下部的节间常比叶长。叶披针形,通常长5—10厘米,宽1.7—3.3厘米,向上渐变小,先端锐尖或渐尖,基部渐狭而延伸至具微具狭翅的叶柄,边缘在基部以上有圆齿状锯齿,近薄纸质,上面沿脉上密生余部疏生糙伏毛,下面毛被较密,杂有金黄色腺点,侧脉4—5对,在两面稍明显;叶柄具狭翅,向