

脉略被细小的糙伏毛,余部均密布金黄色的小腺点,侧脉4—5对,在上面稍显著,下面突出,坚纸质;叶柄长3—4厘米,上部由于叶基下延而多少呈翅状,有细小的糙伏毛,上面具槽,下面近圆形。轮伞花序具6—13花,有时具4—5花,细小,轮廓近圆球形,在花蕾时径1.5—1.8厘米;小苞片细小,钻形,长约1毫米,早落;花柄长1.5毫米,被糙伏毛。花萼倒圆锥形,短小,长约4毫米,外被糙伏毛及腺点,有时脱落近于无毛,内面无毛,脉10,显著,齿5,等大,正三角形,极短,长约1毫米,有小尖头。花冠黄色或白色,长约1.3厘米,冠筒细长,直伸,近等大,略超出于萼筒,外面无毛,内面具柔毛环,冠檐二唇形,上唇椭圆形,先端2浅裂,外疏被短柔毛,内面无毛,下唇稍大,3裂,中裂片倒梯形,先端微缺,较大,侧裂片长圆形。雄蕊4,前对较长,均短于上唇片很多,花丝丝状,基部被微柔毛,插生于冠筒喉部。花柱内藏,先端近相等2浅裂。花盘波状,平顶。子房顶端被柔毛。花期5—6月。

产广东海南;生于密林中荫蔽处或林缘,海拔约150米,模式标本采自越南。

系3.近革叶假糙苏系——Ser. Subcoriaceae G. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 10(1):73. 1965.

萼齿三角形或不明显因而萼口近截平,但先端明显由脉向外呈翅状伸展。

22. 短叶假糙苏

Paraphlomis brevifolia G. Y. Wu et H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 10(1):73. 1965.

直立草本。茎钝四棱形,极密被淡黄色倒向疏柔毛,向基部无叶,不分枝。叶长圆形或卵圆状长圆形,长5—8厘米,宽2.4—3.4厘米,先端急尖,基部钝至近圆形,边缘有波状圆齿,近革质,上面密生下面较密生淡黄色微柔毛,下面还杂有金色腺点,侧脉4—5对,与中肋在上面微下陷,下面突起;叶柄短,长3—6毫米,腹平背凸,密被淡黄色微柔毛。轮伞花序2花,着生于枝条上部叶腋内;小苞片细小,脱落;花梗短,长约1毫米,密被淡黄色微柔毛。果萼倒圆锥形,长约6毫米,外密生淡黄色小疏柔毛,内面在齿上被微柔毛,余部无毛,脉5,上部明显但下部不明显,齿5,三角形,长约1.75毫米,先端明显由脉向外呈翅状伸展,反折。花未见。未成熟小坚果褐色,长圆状三棱形,长2.5毫米,宽1.5毫米,先端截平,密被小疏柔毛,基部渐狭。

产广西北部。

23. 近革叶假糙苏(植物分类学报 10 卷 1 期) 图版 111

Paraphlomis subcoriacea G. Y. Wu ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin