

10(1):73, pl. XVII. 1965.

直立草本，高约 60 厘米。茎钝四棱形，略具槽，极密被倒向贴生淡黄色小疏柔毛，向基部无叶，不分枝。叶披针形至长披针形，长 7—15 厘米，宽 1.5—3 厘米，先端渐尖，基部渐狭或骤然钝形，边缘在基部以上疏生具胼胝尖的小锯齿，近革质，上面橄榄绿色，下面较淡，幼叶上面极密被下面沿肋及脉上密被贴生淡黄色小疏柔毛，余部无毛，老时上面沿肋上密被余部疏被贴生小刺毛，下面仅在肋及侧脉上密被贴生小疏柔毛，侧脉 5—6 对，与中肋在上面近于显著，下面明显突出；叶柄长 1—1.3 厘米，极密被倒向贴生淡黄色小疏柔毛，腹面具槽，背面突起。轮伞花序 2—8 花，在上部叶腋中着生；小苞片微小，钻形，长不及 0.5 毫米，上面无毛，下面被贴生小疏柔毛；花梗长 3—4 毫米，密被贴生倒向淡黄色小疏柔毛。花萼倒圆锥形，连齿长 6 毫米，外面疏被贴生淡黄色小疏柔毛，内面无毛，脉 5，在上部明显，下部消失，齿 5，长 1.5 毫米，不明显，因而萼口近截平，先端明显由脉向外呈翅状伸展。花冠白色或紫白色，长约 1.6 厘米，冠筒稍超出花冠，外面无毛，内面在雄蕊下方有白色的疏柔毛毛环，冠檐二唇形，上唇长圆形，长 10 毫米，宽 4.5 毫米，盔状，内凹，先端波状，外面密被淡黄色小疏柔毛，内面无毛，下唇宽大，轮廓卵圆形，平展，外面在中部疏被小疏柔毛，内面无毛，3 裂，中裂片最大，卵圆形。雄蕊 4，前对较长，均上升至上唇片之下，花丝丝状，扁平，基部具白色疏柔毛，着生在花冠喉部，花药长圆形，2 室，室略叉开。花柱稍超出雄蕊，先端近相等 2 浅裂。花盘杯状，高 0.5 毫米。子房顶端截平，疏被微柔毛。

产广东北部；生于林中及谷地岩石上。模式标本采自广东阳山。

49. 喜雨草属——*Ombrocharis* Hand.-Mazz.

Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:925. 1936.

多年生草本。茎不分枝，下部无叶，上部具叶，被毛。叶具齿裂。轮伞花序由具 3 花的聚伞花序组成，排列成顶生的总状花序；苞片披针形，小苞片微小。花萼钟形，具 11 脉，喉部被长柔毛环，果时增大，近膜质，近裂至 1/2 的二唇形，上唇 2 深裂，裂片披针形，具短尖头及 3 脉，下唇约为上唇 1/2，3 裂，裂片圆形，具短尖头及 1 脉，在凹缺下有二叉状的居间脉，网结。冠筒短而宽，冠檐二唇形，上唇微盔状，深 2 裂，裂片卵圆形，下唇约为上唇 1/2，3 裂，裂片近等大，近圆形，边缘微波状。雄蕊 4，着生

图版 111: 近革叶假糙苏 *Paraphlomis subcoriacea* C. Y. Wu et H. W. Li. 1. 植株；2. 花，侧面观；3. 花萼纵剖，外面观，示萼齿由肋外向呈翅状伸展而成；4. 花冠纵切面，内面观，兼示雄蕊；5. 雌蕊。（曾孝濂绘）

在冠筒中部,内藏,前对稍长,花药椭圆形,药室2,近平行,分离。花柱基生,比花冠短,先端相等2浅裂。小坚果4,卵珠形,压扁,淡褐色,光滑。

单种属,产我国湖南西部。

1. 喜雨草

Ombrocharis dulcis Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:926, Abb. 28, Nr. 2—5. 1939.

多年生草本,高20—30厘米;根茎短,匍匐,增大成粗达3厘米的木质球茎状,具极多纤细须根及干时芳香而甘甜的1—3茎。茎直立,不分枝,纤细,下部无叶,渐无毛,稍圆柱形,上部通常具5对近等大的叶,具四槽,被多少平展长达1.5毫米的淡紫色具节柔毛。叶卵圆形或长圆状卵圆形,长4—12厘米,宽与长相等或常为其1/3,先端锐尖或短渐尖,基部宽楔形且较短下延至叶柄,边缘除基部外均具密而粗的圆齿状锯齿,膜质,两面散布黄色小腺点,此外上面在5—8对弧形侧脉上被极短的卷曲疏柔毛,叶片上面疏被小刺毛,下面色较淡,在干时变褐色的脉极疏被小长柔毛,叶柄长为叶片2/3至1/5,被短绒毛。花序顶生,总状,被极短下曲的短绒毛,连短总梗长4—7厘米,疏松,由对生的聚伞花序组成,聚伞花序彼此间距离6—15毫米,近无梗,具3花;苞片披针形,长约5毫米,草质,无柄,全缘或具少数牙齿,两端渐尖,被小缘毛,小苞片微小;花梗肉质,长9—15毫米,开展,在顶端被较长的小疏柔毛,但侧生的较短。花萼钟形,长4—5毫米,11脉,外面在脉上被极短的疏柔毛,具腺点,喉部被长柔毛毛环,果时增大,长达8毫米,近膜质,近裂至1/2的二唇形,上唇2裂近达2/3,裂片披针形,具短尖头,3脉,下唇约为上唇1/2,3裂,裂片圆形,具短尖头,1脉,在凹缺下有二叉状的居间脉,网结。花冠淡紫色,长6—8毫米,冠筒短且宽,冠檐二唇形,边缘具小乳突状缘毛,上唇长3—4毫米,微盔状,下部具脉网,背面疏被疏柔毛,深2裂,裂片卵圆形,下唇约为上唇1/2,3裂,裂片近等大,近圆形,边缘微波状。雄蕊4,着生在冠筒中部,直伸,在花冠唇裂之下,花丝丝状,前对稍长,花药椭圆形,药室近平行,分离,圆形。花柱基生,比花冠短,先端相等2浅裂。小坚果4,卵珠形,长约2毫米,压扁,淡褐色,光滑。(标本未见,摘自原描写)

产湖南西部:生于亚热带常绿林下的沟谷处,海拔约1250米。模式标本采自湖南武岗。