

产辽宁,河北,山东,山西,河南,陕西,甘肃,青海,四川,云南,广西,广东,湖南,江西及江苏等省区,原产我国,野生于华北及西北各省区,余地均多栽培;生于湿润地及积水处,海拔可达 3200 米。欧洲,日本,北美等地广为栽培。模式标本采自日本。

地下肥大块茎供食用,形状珍奇,脆嫩无纤维,最宜作酱菜或泡菜。贵州用全草入药,治肺炎、风热感冒。

本种在中日文参考书中常误从本草纲目及植物名实图考作草石蚕,非是。

10b. 软毛变种

var. malacotricha Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**: 83. 1934.

这一变种与原变种不同在于植株毛被灰白,密集或常疏生,虽平展及直伸,但很纤细而短。

产山西及陕西;生于山谷潮湿地或水沟边,海拔 800—1600 米。模式标本采自山西安邑中条山。

10c. 近无毛变种

var. glabrescens C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10** (3): 222. 1965.

这一变种与原变种不同在于植株各部近于无毛。

产湖北西部及四川东部;生于坡地上,海拔 2400 米。模式标本采自湖北秭归。

11. 少毛甘露子 蚕子(湖北巴东)

Stachys adulterina Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 300. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 180. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 188. 1929.

多年生草本,具块茎,几全部无毛,高 60—120 厘米。茎单一,明显四稜形,节间有时比叶长。基生叶不见,叶除少数上部苞叶外均明显具长柄,叶柄具槽,边缘常被小缘毛,叶片膜质,长圆状披针形,连叶柄长达 15 厘米,下部茎叶叶片较小,有时近圆形,均先端常锐尖,基部常圆形,时而近楔形,时而近心形,边缘为锯齿状圆齿,两面无毛,或被极疏的糙伏毛,多脉。花红色或白色,长约 1.9 厘米,近无梗;轮伞花序少数,约 6 花。花萼具小刚毛,稍偏斜,长为花冠之半,脉 5,明显,萼齿宽三角形,有稍钝的硬尖头,稍外弯。花冠上唇盔状,外面有长硬毛,包被雄蕊,下唇圆形,具波状边缘,3 裂,侧裂片稍小。雄蕊几等长,花丝中部以下膨大,被柔毛。小坚果近圆球形,无毛,腹面具稜。(标本不完全,参照原描写)

产湖北西部及四川东部;生于菜地边,海拔约 1800 米。根茎肥大,可作菜食。模式标本采自湖北巴东。