

2. 白毛火把花 白毛炮仗花(植物分类学报 8 卷 1 期) 图版 4:13—16

Colquhounia vestita Wall. Tent. Fl. Nepal. **1**: 14. 1824, p. p. quoad specim. Kamaon.; Pl. Asiat. Rar. **3**: 43, pl. 269. 1832, quoad fig.; Benth. in DC. Prodr. **12**: 457. 1848, excl. pl. Assam.; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 674. 1885, quoad pl. Kamaon.; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 41. 1959——*Colquhounia coccinea* Wall. var. *β. vestita* Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal **62**: 36. 1893.

灌木,直立,高 1.5—3 米。老枝近圆柱形,近无毛,皮层纵裂脱落,幼枝密被灰白色绵毡绒毛。叶卵圆形或椭圆状卵圆形,长 5.5—12 厘米,宽 2—6 厘米,先端锐尖,基部圆形或浅心形,边缘具小圆锯齿,草质,上面深绿色,具细皱,混生有单毛及具柄的星状毛,下面灰白色,密被毡状绒毛,侧脉 6—8 对,在上面平展或略凹陷,下面隆起;叶柄长 1.2—1.5 厘米。轮伞花序 6—10 花,在茎枝上多数聚集,由于向顶生长而组成近总状的穗状花序,除花冠外各部均密被毡状绒毛,下承以苞片;苞片短小,线形;花梗短小,长约 1 毫米。花萼近管形,长 1.2—1.5 厘米,外被毡状绒毛,内面无毛,脉不显著,齿 5,三角形,长 1.5—2 毫米。花冠橙红色,外疏被星状毛及单毛,长约 2.5 厘米,冠筒长约 2 厘米,向外方弯曲,喉部增大,下部狭长,冠檐二唇形,上唇卵圆形,下唇 3 浅裂,裂片卵圆形,中裂片先端微缺。雄蕊 4,前对较长,花丝丝状,具髯毛,花药卵圆形,2 室,室略叉开。花柱丝状,先端不相等 2 浅裂。花盘平顶。子房具腺点。花期 7 月。

产云南西部;生于灌丛中,海拔约 2000 米。模式标本采自印度北部。

3. 金江火把花 金江炮仗花(植物分类学报 8 卷 1 期)

Colquhounia compta W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinburgh **11**: 96. 1916; in *ibid.* **17**: 245. 1929—30; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 181. 1929; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 42. 1959.

3a. 金江火把花(原变种) 图版 4:8—12

var. **compta**

灌木,高 1—2 米,直立,多分枝。幼枝近圆柱形,初时密被由单毛及星毛混合组成的灰色短绒毛,老熟时近于无毛,此时皮层纵裂脱落。叶卵圆形或长卵圆形,通常长 4—5 厘米,宽 2.5—3 厘米,但在幼枝上部及短枝上者变小很多,先端近锐尖,基部截形,圆形至心形,边缘具小圆齿,坚纸质,上面绿色,具皱纹,被由单毛及星状毛混生的绒毛,下面密被灰白色绒毛,侧脉 4—6 对,上面凹陷,下面隆起;叶柄长 1.5—2 厘米,有时短枝上的叶柄短很多,被绒毛。聚伞花序腋生,少花,具梗,常常在具小叶的

