

形,棕褐色,变无毛,上部钝四棱形,密被黄褐色倒向微柔毛。茎叶宽卵圆形,长10—15厘米,宽5—10厘米,先端渐尖,基部宽楔形且骤然渐狭下延,膜质,上面绿色,下面淡绿色,两面沿中脉及侧脉被微柔毛,余部疏生白色糙伏毛,但老叶仅上面疏生白色糙伏毛下面无糙伏毛,侧脉4—6对,斜升,两面明显,细脉两面可见,边缘在基部以上有圆齿状牙齿;叶柄纤细,扁平,长约为叶片长之半,密被黄褐色微柔毛。轮伞花序6花,在茎顶密集成近长圆柱状长(2)5—10(15)厘米的穗状花序,总梗长约1厘米,与序轴密被微柔毛;苞片明显,扁圆形或近圆形,长约6毫米,宽约7毫米,先端骤然渐尖,边缘具小缘毛,膜质;花梗长约2毫米,密被微柔毛。花萼管状钟形,长约6毫米,外疏被微柔毛,内面无毛,15脉,膜质,近二唇形,上唇3齿,下唇2齿,齿近等大,宽卵圆状三角形,先端锐尖。花冠白色或白色带浅红,长约1.3厘米,外面疏被微柔毛,内面在冠筒离基部4毫米处有横向间断短柔毛毛环,冠筒纤细,近等粗,至喉部微扩大,冠檐二唇形,上唇短小,直伸,下唇大,开展,3裂,裂片近圆形,中裂片较大。雄蕊4,前对较长,靠着上唇上升,微伸出,花丝丝状,短小,花药2室,室极叉开,汇合为一室。花盘杯状。花柱纤细,不超出雄蕊,先端近相等2浅裂。子房顶端被突起及毛。花期8—9月。

产西藏东南部(墨脱);生于山坡常绿阔叶林下,海拔750—1360米。锡金,印度东北部及缅甸也有。等模式标本采自锡金、印度东北部及缅甸。

西藏东南部产的植物,花萼明显15脉,冠筒内具横向间断毛环,这两点与 Hook f. 的原描写均不相符,也有可能 Hook. f. 的原描写不准确,但从分布区看无疑应归入本种。

55. 广防风属——*Epimeredi* Adans.

Adans. Fam. Pl. **2**: 192. 1763——*Anisomeles* R. Br Prodr.

503. 1810; Benth. in DC. Prodr. **12**: 455. 1848; Benth. et Hook.

f. Gen. Pl. **2**: 1207. 1876.

直立、粗壮草本。叶具齿;苞叶叶状,向上渐变小而呈苞片状。轮伞花序多花密集,在主茎或侧枝顶端排列成稠密的或间断的长穗状花序;苞片线形,细小。花萼钟形,10脉,不明显,下部有多数纵向细脉,上部横脉网结,齿5,相等,直伸,果时不甚

图版 6: 广防风 *Epimeredi indica* (Linn.) Rothm., 1. 植株上部; 2. 花, 侧面观; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雌蕊; 6. 小坚果, 背面观。(曾孝濂绘)

增大。花冠筒与花萼等长,内面有小疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇直伸,短,全缘,微凹,下唇平展,长,3裂,中裂片较大,先端微缺或2裂,侧裂片短。雄蕊4,伸出,二强,前对稍长或有时后对较长,前对花药2室,具横的位置,后对药室退化成1室。花柱先端2浅裂,裂片钻形,近相等。花盘平顶,具圆齿。小坚果近圆球形,黑色,具光泽。

约7—8种,分布于热带亚洲至澳大利亚。我国有1种,产西南至台湾。

1. **广防风** 马衣叶(种子植物名称),防风草(广州植物志,中国种子植物科属辞典),土防风(广东药店俗称),防风草、排风草、土藿香、落马衣、秒草、抹草、臭秒草、假豨蓂、芒草、大密草、荆芥、豨蓂草(广东),薄荷(广东阳山),白艾花(广州),旺草(广东大鱼山),蜜草(广东儋县,海口),臭草(广东澄迈),秒草、假藿香、臭秒草、大羊胡躁、假豨蓂、防风草、九层楼、土防风、七草(广西),防风草、豨蓂草(福建),野薄荷(福建沙县),猪麻苏(福建长汀),防风草、野苏麻(贵州兴义),土藿香(贵州荔波),野苏(四川金阳),野紫苏(四川布拖),癩蛤蚂(云南河口)茴草(中国植物科属检索表) 图版6

Epimeredi indica (Linn.) Rothm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **53**: 12. 1944——*Nepeta indica* Linn. Sp. Pl. 571. 1753——*Marrubium indicum* (Linn.) Burm. Fl. Ind. 227. 1768——*Anisomeles indica* (Linn.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 512. 1891; Merr. in Lingnam Agr. Rev. **2**: 136. 1925; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 926. 1936; et in Beih. Bot. Centralbl. **56B**: 458. 1937; Mukerj. in Rec. Bot. Surv. Ind. **14**(1): 152. 1940; Back. & Bakh. f. Fl. Java **2**: 624. 1965; H. Keng in Gard. Bull. Singapore **24**: 34, f. 5. 1969——*Anisomeles ovata* R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, **2**: 364. 1811; J. F. Jacq. Ecol. **1**: t. 86. 1814—15; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**: 59. 1830; Labiat. Gen. et Sp. 302. 1833; et in DC. Prodr. **12**: 455. 1848; Fl. Hongk. 278. 1861; Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. 19, Suppl. **1**: 375. 1843; Hook. in Journ. Bot. Kew. Misc. **2**: 358. suppl. t. 19. 1850; Hook. f. in Fl. Brit. Ind. **4**: 672. 1885; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 299. 1890; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 211. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 178. 1915; Doan in Lect. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 1012, f. 105, 11—16. 1936.

草本,直立,粗壮,分枝。茎高1—2米,四棱形,具浅槽,密被白色贴生短柔毛。叶阔卵圆形,长4—9厘米,宽2.5—6.5厘米,先端急尖或短渐尖,基部截状阔楔形,边缘有不规则的牙齿,草质,上面榄绿色,被短伏毛,脉上尤密,下面灰绿色,有极密的白色短绒毛,在脉上的较长,叶柄长1—4.5厘米;苞叶叶状,向上渐变小,均超出轮伞花