

序,具短柄或近无柄。轮伞花序在主茎及侧枝的顶部排列成稠密的或间断的直径约2.5厘米的长穗状花序;苞片线形,长3—4毫米。花萼钟形,长约6毫米,外面被长硬毛及混生的腺柔毛,其间杂有黄色小腺点,内面有稀疏的细长毛,10脉,不明显,下部有多数纵向细脉,上部有横脉网结,齿5,三角状披针形,长约2.7毫米,边缘具纤毛,有时紫红色,果时增大。花冠淡紫色,长约1.3厘米,外面无毛,内面在冠筒中部有斜向间断小疏柔毛毛环,冠筒基部宽约1.7毫米,向上渐变宽大,至口部宽达3.5毫米,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,长4.5—5毫米,宽3毫米,全缘,下唇几水平扩展,长9毫米,宽5毫米,3裂,中裂片倒心形,长约3毫米,宽约4.5毫米,边缘微波状,内面中部具髯毛,侧裂片较小,卵圆形。雄蕊伸出,近等长,前对稍长或有时后对较长,花丝扁平,两侧边缘膜质,被小纤毛,粘连,前对药室平行,后对药室退化成1室。花柱丝状,无毛,先端相等2浅裂,裂片钻形。花盘平顶,具圆齿。子房无毛。小坚果黑色,具光泽,近圆球形,直径约1.5毫米。花期8—9月,果期9—11月。

产广东,广西,贵州,云南,西藏东南部,四川,湖南南部,江西南部,浙江南部,福建及台湾;为一杂草,生于热带及亚热带地区的林缘或路旁等荒地上,海拔40—1580(—2400)米。印度,东南亚经马来西亚至菲律宾也有。模式标本采自印度。

全草入药,为民间常用药草,治风湿骨痛、感冒发热、呕吐腹痛、胃气痛、皮肤湿疹、搔痒、乳痈、疮癣、癰疮以及毒虫咬伤等症。

56. 簇序草属 *Craniotome* Reichenb.

Reichenb. Icon. Exot. 1: 39, pl. 54. 1824.

多年生直立分枝草本,各部密被平展硬毛。叶具长柄,圆齿;苞叶在花枝最下部者与茎叶同形,在花枝上部者变小,呈苞片状。聚伞花序具梗,多花,蝎尾状,或偶有二歧状,多数密集排列成腋生或顶生下部常分枝的聚伞式圆锥花序。花小,具柄,其下有小苞片;小苞片线形,具缘毛。花萼卵珠状,果时近于壶状球形,喉部略收缩,内面在喉部上方有柔毛,10脉,齿5,近相等,其中最上1齿较大。花冠伸出萼筒,冠筒直而短,等粗,喉部略增大,冠檐二唇形,上唇直伸,短小,全缘,内凹,下唇较长,平展,3裂,中裂片最大,均呈卵圆形。雄蕊4,前对较长,均上升至上唇片之下,花药2室,室平叉开。花柱丝状,先端略增粗,近相等2浅裂。花盘平顶。子房无毛。小坚果近球状三棱形,细小,有光泽。

单种属,分布自尼泊尔经缅甸及老挝至越南北部。在我国见于云南和四川。

1. 簇序草 图版7

Craniotome furcata (Link) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 516. 1891; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1): 43. 1959——*Ajuga furcata* Link, Enum. Hort. Berol. 2: 99 1822——*Craniotome versicolor* Reichenb. Icon. Bot. Exot. 1: 39, pl. 54. 1824; Benth. in Wall. Pl. Asiat. Rar. 1: 64. 1830; Labiat. Gen. et Sp. 704. 1836; et in DC. Prodr. 12: 455. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 671. 1885; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6: 178. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 182. 1929; Doan in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 1012. pl. 105, f. 5—10. 1936; Mukerj. Labiat. Ind. 151. 1940; Murata in Hara, Fl. E. Himalaya 273. 1966; et in Act. Phytotax. Geobot. 24 (3): 79. 1969——*Anisomeles nepalensis* Spreng. Syst. 2: 706 1825——*Anisomeles furcata* Sweet, Hort. Brit. ed. 1: 315. 1826; London, Hort. Brit. 232. 1830——*Nepeta versicolor* Trev. in Nov. Act. Nat. Cur. 13: 183. 1826.

草本。茎圆柱形，高 1—2 米，基部近木质，密被平展硬毛，有时分枝。叶阔卵圆状心形，边缘具圆齿，膜质，两面密被平展硬毛，上面绿色，下面色较淡，但毛被尤为密集，其间混生有金黄色腺点，侧脉 4—6 对；叶柄长 2.5—7 厘米，扁平，密被硬毛。聚伞花序具梗，梗长约 6 毫米，向上渐变短，其下承以苞叶，花序多花，常呈蝎尾状，有时成二歧状，此时则一歧常极长，另一歧短很多，多数聚伞花序又密集排列成腋生或顶生下部常分枝的聚伞式圆锥花序，长 14—18 厘米，通常顶生者最长；花柄短，其下有一小苞片；苞叶在花枝最下部者，叶状，较大，在花枝最上部者有时呈小匙状，小苞片线形，微小，长不及萼筒，边缘具缘毛。花萼细小，长约 1.5 毫米，外被硬毛及腺点，内面在喉部上方有柔毛，10 脉，齿 5，近相等，其中最上 1 齿较大，均三角状锥形。花冠粉红或紫红色，小，长 3—4 毫米，外面被毛，内面在冠檐上略被毛，冠筒直而短，冠檐二唇形，上唇直伸，短小，全缘，内凹，下唇较长，平展，3 裂，中裂片最大，均呈卵圆形。小坚果细小，有光泽。花期 8—9 月，果期 10 月至翌年 2 月。

产云南（几遍及全省），四川西部（德昌）及西藏南部（聂拉木）；生于林下或灌丛中，海拔 900—3200 米。印度北部，尼泊尔，锡金，不丹，缅甸，老挝，越南北部也有。模式标本采自尼泊尔(?)。

图版 7: 簇序草 *Craniotome furcata* (Link) O. Ktze., 1. 植株上部，示花序；2. 花，侧面观；3. 花冠纵剖，内面观，兼示雄蕊；4. 花萼纵剖，内面观；5. 雌蕊；6. 小坚果，背面观；7. 果萼，兼示小苞片。（王利生绘）

