

序,具短柄或近无柄。轮伞花序在主茎及侧枝的顶部排列成稠密的或间断的直径约2.5厘米的长穗状花序;苞片线形,长3—4毫米。花萼钟形,长约6毫米,外面被长硬毛及混生的腺柔毛,其间杂有黄色小腺点,内面有稀疏的细长毛,10脉,不明显,下部有多数纵向细脉,上部有横脉网结,齿5,三角状披针形,长约2.7毫米,边缘具纤毛,有时紫红色,果时增大。花冠淡紫色,长约1.3厘米,外面无毛,内面在冠筒中部有斜向间断小疏柔毛毛环,冠筒基部宽约1.7毫米,向上渐变宽大,至口部宽达3.5毫米,冠檐二唇形,上唇直伸,长圆形,长4.5—5毫米,宽3毫米,全缘,下唇几水平扩展,长9毫米,宽5毫米,3裂,中裂片倒心形,长约3毫米,宽约4.5毫米,边缘微波状,内面中部具髯毛,侧裂片较小,卵圆形。雄蕊伸出,近等长,前对稍长或有时后对较长,花丝扁平,两侧边缘膜质,被小纤毛,粘连,前对药室平行,后对药室退化成1室。花柱丝状,无毛,先端相等2浅裂,裂片钻形。花盘平顶,具圆齿。子房无毛。小坚果黑色,具光泽,近圆球形,直径约1.5毫米。花期8—9月,果期9—11月。

产广东,广西,贵州,云南,西藏东南部,四川,湖南南部,江西南部,浙江南部,福建及台湾;为一杂草,生于热带及亚热带地区的林缘或路旁等荒地上,海拔40—1580(—2400)米。印度,东南亚经马来西亚至菲律宾也有。模式标本采自印度。

全草入药,为民间常用药草,治风湿骨痛、感冒发热、呕吐腹痛、胃气痛、皮肤湿疹、搔痒、乳痈、疮癣、癰疮以及毒虫咬伤等症。

56. 簇序草属 ——— *Craniotome* Reichenb.

Reichenb. Icon. Exot. 1: 39, pl. 54. 1824.

多年生直立分枝草本,各部密被平展硬毛。叶具长柄,圆齿;苞叶在花枝最下部者与茎叶同形,在花枝上部者变小,呈苞片状。聚伞花序具梗,多花,蝎尾状,或偶有二歧状,多数密集排列成腋生或顶生下部常分枝的聚伞式圆锥花序。花小,具柄,其下有小苞片;小苞片线形,具缘毛。花萼卵珠状,果时近于壶状球形,喉部略收缩,内面在喉部上方有柔毛,10脉,齿5,近相等,其中最上1齿较大。花冠伸出萼筒,冠筒直而短,等粗,喉部略增大,冠檐二唇形,上唇直伸,短小,全缘,内凹,下唇较长,平展,3裂,中裂片最大,均呈卵圆形。雄蕊4,前对较长,均上升至上唇片之下,花药2室,室平叉开。花柱丝状,先端略增粗,近相等2浅裂。花盘平顶。子房无毛。小坚果近球状三棱形,细小,有光泽。

单种属,分布自尼泊尔经缅甸及老挝至越南北部。在我国见于云南和四川。

1. 簇序草 图版 7