

毫米,冠檐二唇形,上唇盔状,长9毫米,顶部较长地平伸,基部有2个三角形的爪,下唇近圆形,外反,先端3裂,中裂片圆形,侧裂片卵圆状三角形。雄蕊4,近等长,包于盔内,微外露,花丝扁平,上部及药隔黑褐色。花柱丝状,无毛,先端极不相等2浅裂。花盘浅杯状,边缘具波状齿。子房无毛。小坚果卵圆状三棱形,黑褐色,平滑,长约1.6毫米,宽约1.1毫米。花期9月。

产四川西南部;生于阳坡阔叶林下,海拔约2700米。模式标本采自四川木里。

8. 峨眉冠唇花 四稜香、大叶紫苏、野犬麻(四川峨眉)

Microtoena omeiensis C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. 10(1): 51. 1965——*Microtoena urticifolia* auct. non Hemsl.: C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1): 45. 1959, p. p. maj.

粗壮草本。茎高1—2米,锐四棱形,具槽,被疏生具节柔毛或微柔毛。叶长圆状卵圆形或三角状卵圆形,长4—13厘米,宽3—10厘米,先端长尾状渐尖,基部截形、截状楔形至心形,边缘为具细突尖的粗圆齿,膜质,上面深绿色,被极疏的具节小刚毛,下面较淡或近顶端者带红色,脉上被极疏短伏毛,稀无毛,叶柄扁平,长达13厘米,具条纹。花序为腋生二歧聚伞花序,连总梗在内长约3厘米;总梗长(1)—1.6厘米,纤细,被毛同于茎;苞片披针形,早落,长2—3毫米。花萼花时钟形,长约5毫米,宽约3毫米,外面被尘状腺毛,沿肋及齿缘被小刺毛,内面无毛,齿三角状披针形,前4齿长0.6—1毫米,后面1齿长约为前齿的2倍,果时花萼囊状增大,网脉十分清晰。花冠淡黄色,长约3厘米,外面被微柔毛,冠筒基部宽约1.8毫米,喉部宽约7毫米,冠檐二唇形,上唇盔状,长约8毫米,直立,基部截形,两侧有爪,下唇长约1厘米,先端3裂,中裂片较长,长圆形,长约2.5毫米。雄蕊4,近等长,包于盔内,花丝扁平,无毛。花柱丝状,扁平,先端极不相等2浅裂。花盘杯状,不明显的浅裂。子房无毛。小坚果扁平凸状倒卵圆形,深褐色,长约1.9毫米,宽约1.5毫米。花期8月,果期8—9月。

产四川中部;生于空旷草地上,海拔1500—1700(4000)米。模式标本采自四川峨眉。

四川峨眉民间用全草入药,煎水服用于清寒发表,或煎水外洗可治风湿。

9. 狭萼冠唇花(植物分类学报10卷1期)

Microtoena stenocalyx C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. 10(1): 49. 1965——*Microtoena mounpinensis* auct. non (Franch.) Prain: C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. 8(1): 46. 1959, p. p., excl. speciminibus Kweichowensibus et Szechuanensibus.