

或在茎上部少数腋生。

15. 梵净山冠唇花(植物分类学报 10 卷 1 期)

**Microtoena vanchingshanensis** C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10**(1): 52, pl. XIV. 1965——*Microtoena moupinensis* auct. non (Franch.) Prain: C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 46. 1959, p. p.

草本。茎高约 60 厘米,基部匍匐生根,四棱形,具沟,干后浅黄褐色,被具节的刺毛及混生的短微柔毛,在基部近无毛,分枝极短,顶部具圆锥花序。茎叶卵圆状心形,长 4.5—7.5 厘米,宽 3—4.5 厘米,生于侧枝上的小许多,先端短渐尖,基部心形,边缘为具小突尖的圆齿,膜质,干时两面均为褐色,被贴生的具节小刺毛,脉上较密,叶柄扁平,长 2—5.2 厘米,具细条纹,毛被同于茎;苞叶叶状,卵圆状心形,长 11—13 毫米,宽 7—8 毫米,向上渐变小。聚伞花序小,具 3—(5)花,具长 3—6 毫米的总梗,约 5—7 个在侧枝顶端组成圆锥花序,或在主茎上部的少数单生于叶腋;苞片线形,长约 2.5—4 毫米。花萼花时钟形,长约 8 毫米,宽 3.5 毫米,外面被具节刺毛,内面仅齿上被具节刺毛,其余部分几无毛,齿 5,三角状卵圆形,极不等大,后 3 齿较前 2 齿约长一倍,后中齿最大,前 2 齿长约 1.5 毫米,果时花萼增大,肋间横脉十分清晰。花冠白色,长 2.3 厘米,内外两面均无毛,冠筒基部宽约 1.5 毫米,喉部宽约 6 毫米,冠檐二唇形,上唇长约 7 毫米,盔状,顶部平伸,基部截形,下唇略长,椭圆形,先端 3 裂,中裂片倒卵圆形,长约 2 毫米,宽 1.5 毫米,侧裂片钝。雄蕊 4,与上唇等长,包于盔内,花丝扁平,中部以下边缘膜质,被微柔毛。花柱丝状,无毛,先端极不相等 2 浅裂。花盘阔环状,边缘微有起伏。子房无毛。小坚果未见。花期 8 月。

产贵州东北部;生于河沟边,海拔约 1650 米。模式标本采自贵州梵净山。

系 6. 大萼系——Ser. Urticifoliae C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10**(1): 53. 1965.

花萼大,长 8—12 毫米,稀 5—6 毫米,齿三角状钻形,先端微弯或挂钩状,5 齿近相等,稀后 1 齿比其余 4 齿长近一倍;花冠黄色,下唇中裂片近圆形,有时长圆形或卵圆形;花序为由聚伞花序组成的圆锥花序或为二歧聚伞花序。

16. 麻叶冠唇花(植物分类学报 8 卷 1 期)

**Microtoena urticifolia** Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 308. 1890; Prain in Bull. Bot. Soc. France **42**: 425. 1895; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 188. 1915, p. p. quoad specimen Hupehense; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ.

**2:** 184. 1929; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 45. 1959, quoad nomen tantum; Hsuan in ibid. **10**(1): 53. 1965.

**16a. 麻叶冠唇花**(原变种)

**var. urticifolia**

草本粗壮, 直立, 高 1—1.2 米, 被稀疏的小疏柔毛、小刚毛或微柔毛。茎四棱形或近于四方形, 略粗厚, 但不为木质, 节间比叶短。叶具长而纤细的柄, 薄膜质, 卵圆形或心状卵圆形, 不连叶柄长 7.5—12.5 厘米, 通常长渐尖, 基部心形、截形或有时为楔形, 边缘具粗锯齿, 两面被稀疏的小糙伏毛, 尤其叶下面沿脉上被横出平展的柔毛; 叶柄细长, 长 5—12.5 厘米。花黄色, 芳香, 长 2.5—3.1 厘米, 具短梗, 被微柔毛, 组成略松散的聚伞状圆锥花序。花萼被小刚毛, 齿钻形, 花时后面 1 齿较其余 4 齿长一倍, 花萼于花后膨大, 坚硬, 具横脉。花冠筒近直伸, 极狭, 突然宽二唇状, 盔中部以下前方有明显的胼胝尖裂片, 下唇圆的 3 裂, 中裂片较长。雄蕊 4, 包于盔内, 花丝极靠近, 中部以下具小髯毛。小坚果扁卵珠形或椭圆形, 褐色, 光亮。(标本未见, 摘自原描写)

产湖北西部。模式标本采自湖北巴东。

**16b. 短梗变种**

**var. brevipedunculata** C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10**(1): 54. 1965—*Microtoena urticifolia* auct. non Hemsl.: C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 45. 1959, p. p. min.

这一变种与原变种不同在于花序为腋生二歧聚伞花序; 总梗短, 长 5—10 毫米; 萼齿披针形, 后面的略长。

产湖南西部; 生于山坡上。模式标本采自湖南黔阳太婆山。

**17. 宝兴冠唇花** 穆坪冠唇花(植物分类学报 8 卷 1 期)

**Microtoena moupinensis** (Franch.) Prain in Bull. Soc. Bot. France **42:** 426 1895; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6:** 189. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2:** 185. 1929; C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **8**(1): 46. 1959, p. p. quoad specimina Szechuanensis; Hsuan in ibid. **10**(1): 54. 1965—*Clerodendron moupinense* Franch. Pl. David. **2:** 106. 1888.

草本, 多年生, 直立。茎高 0.6—1 米, 四棱形, 具深槽, 上部被平展的具节刚毛及混生的短腺毛, 下部多少被平展的具节刚毛。茎叶卵状心形或三角状卵圆形, 长 2.5—7.2 厘米, 宽 2—6 厘米, 生于侧枝上的小许多, 先端短尾状渐尖, 基部心形, 稀截状阔