

本采自四川康定。

2. 洪桥鼠尾草

Salvia potanini Kryl. in Trav. Mus. Bot. Acad. Imp. Petrograd **14**: 141, t. 3. 1915; Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 113. 1934.

多年生直立草本，根肥大。茎高 30—38 厘米，单生，不分枝，被疏柔毛，上部较密。叶有基生叶和茎生叶两种，均具柄，叶片卵圆形或长圆状卵圆形，长 3—7 厘米，宽 1.2—5.3 厘米，先端钝，基部浅心形或近戟形，边缘具圆齿，纸质，上面被微硬伏毛，其间混生具节疏柔毛，下面被微硬伏毛，腺点不明显；叶柄基生者最长，长为叶片长之 2.5 倍，向上渐变为近无柄，被疏柔毛。轮伞花序 6 花，于茎顶密集组成长 6—10 厘米的总状花序；苞片卵圆形或长圆状卵圆形，长 0.8—3.5 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，先端钝，基部渐狭，两面被微硬伏毛，边缘具缘毛；花梗长约 3 毫米，与序轴密被疏柔毛。花萼狭钟形，长 1.5—1.9 厘米，外密被疏柔毛，脉上毛更多，无深色腺点，内面无毛，二唇形，上唇三角状宽卵圆形，长 4 毫米，宽 9 毫米，先端锐尖，全缘，下唇与上唇近等大，半裂为 2 齿，齿斜向三角状卵圆形，靠近，锐尖。花冠淡黄色，大型，长 3.5—4 厘米，外面被柔毛，内面在冠筒基部有近于水平向的疏柔毛环，冠筒长约为花萼长之 2 倍，自萼内直伸向前，基部宽约 4 毫米，向上骤然宽大，至伸出花萼部分宽达 8 毫米，其上至喉部等宽呈圆筒状，冠檐二唇形，上唇直伸，近圆形，宽约 7 毫米，先端微缺，下唇比上唇稍长，3 裂，中裂片浅倒心形，长 5 毫米，宽 6 毫米，侧裂片较小，卵圆形，宽约 3.5 毫米。能育雄蕊伸在上唇内面，花丝扁平，长 7 毫米，药隔弧形，长约 4.5 毫米，上臂和下臂近等长，二下臂各有横生的药室，并互相联合；退化雄蕊短小，花丝长不及 2 毫米。花柱伸出花冠外，先端 2 浅裂，裂片不相等，前裂片较长。花盘前方稍膨大。子房裂片椭圆形。成熟小坚果未见。

产四川西部；生于灌丛中路旁，海拔 4000 米。模式标本采自四川洪桥山。

3. 长花鼠尾草

Salvia dolichantha Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 113. 1934.

多年生直立草本。茎高 (15)35—60—80 厘米，单生，不分枝，被渐脱落疏柔毛，下部近无毛，钝四棱形，具四槽，槽内具条纹。基生叶未见；茎生叶心状或戟状卵圆形，长 6.5—9 厘米，宽 5.5—9 厘米，先端锐尖，基部心形或戟形，边缘具不整齐的重圆齿状牙齿，齿尖具短尖突，草质，上面疏被疏柔毛，沿脉上较密，下面近无毛或沿脉上被疏柔毛，密布暗紫色腺点，叶柄最长达 15 厘米，扁平，被疏柔毛。轮伞花序 3—6 花，在顶端密集下部疏离，组成长 16—18 厘米的总状花序；苞片近圆形或卵圆形，在