

隔弯成半圆状,无毛。下药室先端联合,能育,比上药室小。花柱不相等 2 浅裂。(标本未见,摘自原描写)

产西藏东部;生于高山石砾草地灌木丛中,海拔 3600—4500 米。模式标本采自西藏江达附近。

系 2. 毛地黄鼠尾草系——Ser. Digitaloidites C. Y. Wu in Addenda 580.

叶卵圆形或椭圆形,宽与长的比例为 1:2—3;先端钝,基部楔状渐狭至浅戟形。花冠筒近直立或整个自基部向上弯曲,长 2—4 厘米,长为花萼 2—4 倍。

5. 毛地黄鼠尾草 银紫丹参、白元参(云南丽江),玉名喇叭(云南丽江纳西语)

Salvia digitaloides Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh 5: 234. 1912; Dunn in ibid. 6: 164. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 162. 1929; Stib. in Act. Hort. Götthob. 9: 114. 1934; in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 927. 1936.

5a. 毛地黄鼠尾草(原变种) 图版 13

var. **digitaloides**

多年生直立草本。茎高 30—60 厘米,密被长柔毛。叶通常为基出叶,间有茎生叶,叶片长圆状椭圆形,长 3.5—11 厘米,宽 2—5 厘米,先端钝或圆形,基部圆形,边缘具圆齿,坚纸质,上面深绿色,被疏柔毛,下面微皱,密被白色短绒毛;基出叶叶柄长 6—8 厘米,茎生叶具短柄或至无柄。轮伞花序 4—6 花,3—8 组成长 13 厘米顶生的总状花序,有时由于此花序下部分枝而成圆锥花序;苞片倒卵圆形或卵圆形,全缘,被长柔毛;花梗长 3—4 毫米,与序轴密被长柔毛。花萼钟形,长 10—12 毫米,展开后先端宽 10 毫米,鲜绿色,外面被长柔毛,具紫脉,内面被小粗伏毛,二唇形,上唇宽三角形,长 2—2.5 毫米,宽 5.6 毫米,边缘被长柔毛,先端有靠近的三尖突,下唇较上唇稍大,半裂成 2 齿,齿宽三角形,先端锐尖。花冠黄色,有淡紫色的斑点,长 3.3—3.5 厘米,外面被小疏柔毛,内面离基部 5 毫米有斜向小疏柔毛毛环,冠筒伸出萼外,长约 2.4 厘米,基部宽约 2.5 毫米,渐向上弯曲,并渐膨大,至喉部宽达 1 厘米,冠檐二唇形,上唇长圆形,长 8 毫米,宽 7 毫米,先端圆形或微凹,下唇较上唇大,长 12 毫米,宽 13 毫米,3 裂,中裂片倒心形,宽达 10 毫米,侧裂片半圆形,宽约 4 毫米。能育雄蕊略伸出花冠,花丝扁平,水平状伸出,长 7 毫米,药隔长 6 毫米,弧形,上臂和下臂等

图版 13: 毛地黄鼠尾草(原变种) **Salvia digitaloides** Diels var. **digitaloides**, 1. 植株下部; 2. 植株上部,示花序; 3. 花萼纵剖,内面观,兼示雌蕊; 4. 花冠纵剖,内面观,示毛环和联合的下臂。(蒋杏墙绘)