

长,二下臂有斜生的药室,并互相联合。花柱超出花冠很远,先端不相等 2 浅裂,后裂片极短。花盘前方稍膨大。子房裂片卵圆形。小坚果灰黑色,倒卵圆形,腹面具稜,长 4 毫米,宽 2.5 毫米,光滑。花期 4—6 月。

产云南西北部;生于松林下荫燥地或旷坡草地上,海拔 2500—3400 米。模式标本采自云南鹤庆松桂谷地。

云南用根入药,功用同丹参。

5b. 无毛变种

var. **glabrescens** Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 114. 1934.

这一变种与原变种不同在于叶基部浅心形,下面沿脉上被开展长疏柔毛,叶片近无毛且密被腺点。

产四川西南部;生于谷地,海拔 2300—2500 米。模式标本采自四川雅砻江及安宁河间。

6. 甘西鼠尾草 紫丹参(云南丽江),红秦艽(四川)

Salvia przewalskii Maxim. in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**: 301. 1881; et in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **27**: 526. 1881; Wilson, Arnold Arb. Exped. China 1910—11 t. 307. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 165. 1913; in *ibid.* **6**: 163. 1915, excl. syn.; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 163. 1929; Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**: 217. 1929; Rehd. et Kobuski in Journ. Arn. Arb. **14**: 31. 1933; Stib. in Act. Hort. Göthob **9**: 114, t. 1. 1934; in *ibid.* **13**: 349. 1939; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 928. 1936——*Salvia tatsiensis* Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8, **3**: 149. 1891——*Salvia glutinosa* auct. non Linn.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 164. 1915.

6a. 甘西鼠尾草(原变种) 图版 14:6—9

var. **przewalskii**

多年生草本;根木质,直伸,圆柱锥状,外皮红褐色,长 10—15 厘米,径 3—7 毫米。茎高达 60 厘米,自基部分枝,上升,丛生,上部间有分枝,密被短柔毛。叶有基出

图版 14: 1—5. 钟萼鼠尾草(原变种) **Salvia campanulata** Wall. var. **campanulata**, 1. 植株上部,示花序一部分; 2. 花序顶部; 3. 基部的叶; 4. 花萼纵剖,内面观,兼示苞片及子房; 5. 花冠纵剖,内面观,示毛环和联合的下臂。6—9. 甘西鼠尾草(原变种) **Salvia przewalskii** Maxim. var. **przewalskii**, 6. 植株下部; 7. 花序一部分; 8. 花萼纵剖,内面观,兼示苞片及子房; 9. 花冠纵剖,内面观,示毛环和联合的下臂。(蒋杏墙绘)