

渐尖或锐尖,基部近圆形,下面被疏柔毛,边缘全缘,被长缘毛,下部的比花萼长,向上渐变小,比花萼短;花梗长达4毫米,与序轴均被具节疏柔毛。花萼钟形,长10—14毫米,外面密被短柔毛,沿脉上混生具节疏柔毛,毛间杂有红褐色腺点,内面满布微硬伏毛,二唇形,上唇宽三角状卵圆形,长约4毫米,宽约5毫米,先端短渐尖,下唇较上唇长,长约5.5—6毫米,宽约5毫米,半裂成2齿,齿三角形,长渐尖,果时花萼增大,上缘长1.3厘米,下缘长1.5厘米,口部宽1.2厘米,膜质,脉纹明显,毛被渐脱落。花冠紫色或白色,檐部常带紫斑或为黄色,长2.5—3.5厘米,外面略被短柔毛,内面离基部约5毫米处有水平向的小疏柔毛毛环,冠筒长约为花萼2—3倍,向上腹部渐增大,至喉部径达6毫米,冠檐二唇形,上唇直伸,先端微凹,下唇3深裂,中裂片近圆形,先端为浅波状,侧裂片半圆形。能育雄蕊直伸,花丝长约5—6毫米,扁平;无毛,药隔弯成弧形,长约4—5毫米,中部关节处略被小疏柔毛,上下臂约等长,下药室为上药室长1/2,二下臂药室先端联合。花盘近平顶。花柱略超出雄蕊,先端极不相等2浅裂,后裂片极不明显。花期6—7月。

产四川西南部;生于草坡或路边,海拔约3300米。模式标本采自四川瓦山。

10. 鄂西鼠尾草 红秦艽(四川茂汶)

Salvia maximowicziana Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 285. 1890; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 164. 1913; **6**: 163. 1915; Lévl. Cat. Pl. Yunnan. 145. 1915—16; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 164. 1929; Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 116. 1934——*Salvia fargesii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 220. 1911.

10a. 鄂西鼠尾草(原变种) 图版 17:5—8

var. *maximowicziana*

多年生草本;根茎横生,稍粗厚,径不及1厘米,顶端密被宿存的叶鞘。茎直立,高达90厘米,不分枝,四棱形,被具腺的疏柔毛。叶有基出叶及茎生叶两种,叶片均圆心形或卵圆状心形,长与宽约6—8(11—12)厘米,先端圆形或骤然渐尖,基部心形或近戟形,边缘有粗大的圆齿状牙齿,齿锐尖或稍钝,有时具重牙齿及小裂片,膜质,上面深绿色,近无毛或略被短硬毛,下面色较淡,有明显的脉纹;叶柄扁平,基出叶柄

图版 17: 1—4. 黄鼠狼花 *Salvia tricusps* Franch., 1. 植株下部; 2. 植株上部, 示花序; 3. 花萼纵剖, 内面观, 兼示苞片及子房; 4. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。5—8. 鄂西鼠尾草(原变种) *Salvia maximowicziana* Hemsl. var. *maximowicziana*, 5. 植株上部; 6. 茎生叶; 7. 花萼纵剖, 内面观, 兼示苞片及子房; 8. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。(蒋杏墙绘)