

部者近圆形,直径 1—2 厘米,极全缘或具短齿,上部的宽卵圆形或卵圆形,较短,均先端圆形或稀近锐尖,具脉,有柔毛状缘毛,花梗短,长约 2 毫米,与序轴密被褐色长柔毛。花萼阔钟形,长 1—1.5 厘米,外沿脉被褐色具节长柔毛,余部散布腺点,内被微硬伏毛,二唇形,上唇全缘,具 3 脉,先端微凹,下唇较上唇稍长,半裂成 2 齿,齿三角形,先端具短小突尖。花冠白色或浅黄或乳黄色,有时有少数灰斑,外面疏被但在上唇密被柔毛,内面离冠筒基部 5—7 毫米有斜向间断的疏柔毛毛环,冠筒基部圆柱状,向上腹状膨大,长约为花萼长之二倍,向上稍弯曲,冠檐二唇形,上唇直伸,圆状卵圆形,长约 9 毫米,下唇较上唇长,3 裂,中裂片最大,倒心形,长 8 毫米,宽 12 毫米,先端微凹,边缘略呈波状,无毛,侧裂片半圆形,宽约 5 毫米,具缘毛。能育雄蕊伸在上唇内面,花丝扁平,长约 7 毫米,无毛,药隔长约 6 毫米,无毛,弯成弧形,上下臂近等长,药室均发育,下臂的较小,顶端联合。花柱伸出花冠,先端极不相等 2 浅裂,后裂片极不明显。花盘前方稍膨大。成熟小坚果未见。 花期 4—5 月。

产云南西北部、四川西南部,生于山坡、草地、竹林或松林下,海拔 2700—3300 米。模式标本采自云南丽江干海子。

12b. 紫花变种

var. **purpurascens** C. Y. Wu in Addenda, 云南植物志 **1**: 663. 1976.

这一变种与原变种不同在于花冠淡紫或粉红色。

产云南西北部、四川西南部;生于林下或路旁,海拔 2900—3200 米。模式标本采自云南中甸。

13. 犬形鼠尾草(中国植物学杂志,第三卷) 山藿香(四川) 图版 19:1—3

Salvia cynica Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 164. 1913; in *ibid.* **6**: 163. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 165. 1929; Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 119. 1934; in *ibid.* **13**: 349. 1939.

多年生草本;根茎木质,深褐色,被宿存的叶鞘,其下生出条状根及纤细的须根。茎直立,高 30—50 厘米,钝四棱形,被疏的短柔毛。基出叶未见。茎生叶叶片宽卵圆形或戟状宽卵圆形或近圆形,长 5—20 厘米,宽 3—18 厘米,先端渐尖,基部心状戟

图版 18: 1—4. 圆苞鼠尾草(原变种) **Salvia cyclostegia** Stib. var. **cyclostegia**, 1. 植株上部,示花序; 2. 下部的叶; 3. 花萼纵剖,内面观,兼示苞片及子房; 4. 花冠纵剖,内面观,示毛环和联合的下臂。5—8. 荞麦地鼠尾草柔毛变型 **Salvia kiaometiensis** Lévl. f. **pubescens** Stib., 5. 植株上部,示花序; 6. 下部的叶; 7. 花萼纵剖,内面观,兼示苞片及子房; 8. 花冠纵剖,内面观,示毛环和联合的下臂。(蒋杏墙绘)

形,边缘具重牙齿或重锯齿,纸质,两面绿色,疏被微硬毛,下面散布黄褐色腺点;叶柄腹凹背凸,基部多少宽大,疏被微硬毛,长1—11厘米,下部者最长,向上渐短。轮伞花序2—6花,疏离,组成长达20厘米的总状圆锥花序;苞片披针形,长5—10毫米,先端渐尖,基部渐狭,全缘,具缘毛;花梗长约5毫米,与序轴均被短柔毛。花萼筒形,常带紫色,外被疏柔毛,疏布红褐色腺点,内面满布微硬伏毛,萼筒长13—15毫米,萼檐二唇形,上唇宽三角形,长约4毫米,宽10毫米,先端具长达1.5毫米的小突尖,下唇长约6毫米,宽约8毫米,半裂成2齿,齿长三角形,先端渐尖,果时花萼略增大,膜质。花冠黄色,长达4厘米,外面近无毛,内面在冠筒中部稍下方有多少水平向而在腹面间断的小疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长约10毫米,宽8毫米,先端微凹,直伸,下唇与上唇近等长,平展,3裂,中裂片较大,倒心形,先端微凹,边缘浅波状,侧裂片近半圆形。能育雄蕊伸在花冠上唇下,花丝扁平,长8毫米,药隔长11毫米,中部关节处被小疏柔毛,上臂长7毫米,下臂长约4毫米,较上臂瘦小,顶端横生药室,二下臂药室先端联合。退化雄蕊短小,长约1毫米,不发育。花柱略伸出花冠,先端极不相等2浅裂,后裂片极不明显。花盘前方稍膨大。小坚果圆形,直径2.8毫米,褐色。花期7—8月。

产四川东部及西部;生于林下、路旁、沟边等处,海拔1500—3200米。等模式标本采自四川康定及巫山。

14. **峨眉鼠尾草** (中国植物学杂志,第三卷) 白生麻、南茄草、白气草(四川峨眉),野苏麻(四川冕宁)

Salvia omeiana Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 119. 1934——*Salvia hians* auct. non Royle: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 284. 1890, p. p.; Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 557. 1901——*Salvia maximowicziana* auct. non Hemsl.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 163. 1915, p. p.

14a. **峨眉鼠尾草**(原变种) 图版19:4—6

var. **omeiana**

多年生草本;根茎木质,深褐色,有宿存的叶鞘,其下生出长达30厘米径约1厘米的条状根,条状根上有纤细的须根。茎直立,高40—100厘米,基部粗壮,粗达6毫

图版19: 1—3. **犬形鼠尾草** *Salvia cynica* Dunn, 1. 植株上部, 示花序; 2. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 3. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。4—6. **峨眉鼠尾草**(原变种) *Salvia omeiana* Stib. var. **omeiana**, 4. 叶片; 5. 花萼纵剖, 内面观; 6. 花冠纵剖, 内面观, 示联合的下臂。(蒋杏墙绘)

