

形,边缘具重牙齿或重锯齿,纸质,两面绿色,疏被微硬毛,下面散布黄褐色腺点;叶柄腹凹背凸,基部多少宽大,疏被微硬毛,长1—11厘米,下部者最长,向上渐短。轮伞花序2—6花,疏离,组成长达20厘米的总状圆锥花序;苞片披针形,长5—10毫米,先端渐尖,基部渐狭,全缘,具缘毛;花梗长约5毫米,与序轴均被短柔毛。花萼筒形,常带紫色,外被疏柔毛,疏布红褐色腺点,内面满布微硬伏毛,萼筒长13—15毫米,萼檐二唇形,上唇宽三角形,长约4毫米,宽10毫米,先端具长达1.5毫米的小突尖,下唇长约6毫米,宽约8毫米,半裂成2齿,齿长三角形,先端渐尖,果时花萼略增大,膜质。花冠黄色,长达4厘米,外面近无毛,内面在冠筒中部稍下方有多少水平向而在腹面间断的小疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇长圆形,长约10毫米,宽8毫米,先端微凹,直伸,下唇与上唇近等长,平展,3裂,中裂片较大,倒心形,先端微凹,边缘浅波状,侧裂片近半圆形。能育雄蕊伸在花冠上唇下,花丝扁平,长8毫米,药隔长11毫米,中部关节处被小疏柔毛,上臂长7毫米,下臂长约4毫米,较上臂瘦小,顶端横生药室,二下臂药室先端联合。退化雄蕊短小,长约1毫米,不发育。花柱略伸出花冠,先端极不相等2浅裂,后裂片极不明显。花盘前方稍膨大。小坚果圆形,直径2.8毫米,褐色。花期7—8月。

产四川东部及西部;生于林下、路旁、沟边等处,海拔1500—3200米。等模式标本采自四川康定及巫山。

14. **峨眉鼠尾草** (中国植物学杂志,第三卷) 白生麻、南茄草、白气草(四川峨眉),野苏麻(四川冕宁)

Salvia omeiana Stib. in Act. Hort. Göthob. 9: 119. 1934——*Salvia hians* auct. non Royle: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 284. 1890, p. p.; Diels in Engler, Bot. Jahrb. 29: 557. 1901——*Salvia maximowicziana* auct. non Hemsl.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh 6: 163. 1915, p. p.

14a. **峨眉鼠尾草**(原变种) 图版 19:4—6

var. **omeiana**

多年生草本;根茎木质,深褐色,有宿存的叶鞘,其下生出长达30厘米径约1厘米的条状根,条状根上有纤细的须根。茎直立,高40—100厘米,基部粗壮,粗达6毫

图版 19: 1—3. **犬形鼠尾草** *Salvia cynica* Dunn, 1. 植株上部, 示花序; 2. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 3. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。4—6. **峨眉鼠尾草**(原变种) *Salvia omeiana* Stib. var. **omeiana**, 4. 叶片; 5. 花萼纵剖, 内面观; 6. 花冠纵剖, 内面观, 示联合的下臂。(蒋杏墙绘)