

高黎贡山。

17. 少花鼠尾草

Salvia pauciflora Stib. in Act. Hort. Gothob. 9: 122. 1934.

多年生草本；根茎粗短，分枝或单一，密被宿存的褐色鳞片；根簇生，条状，径约 7 毫米，有时为胡萝卜状增粗，直伸或斜向，外表红褐色，须根丝状。茎 2—4 自根茎生出，纤细，上升或近直立，不分枝，疏具叶，密被长柔毛或变无毛。叶片宽卵圆形或卵圆状三角形，长 2.5—6(7) 厘米，宽 1.2—5 厘米，先端短尖或钝至圆形，基部心形或呈戟形，边缘具圆齿，草质，两面被刚毛或粗伏毛，上面深绿色，下面较淡，具锈褐色腺点；基出叶及下部茎叶叶柄最长，长约为叶片 2—2.5 倍，向上渐短至近无柄，叶柄扁平，密被长柔毛或变无毛。轮伞花序少花，通常 2 花，疏离，组成长 2—8 厘米的总状花序，总状花序有时具分枝，呈总状圆锥花序；苞片位于下部的叶状，较上部的卵圆形，比花萼短，先端锐尖，基部渐狭，全缘，略被粗伏毛，边缘具缘毛；花梗长 2 毫米，与序轴被褐色开展长柔毛及其腺疏柔毛。花萼钟形，长 5—7 毫米，外被具腺疏柔毛，内面被极细微硬伏毛，二唇形，上唇近半圆形，全缘，先端具短尖头，下唇比上唇稍长，半裂成 2 齿，齿卵状三角形，先端近锐尖。花冠淡紫红或紫白色，稀紫色，下唇具白斑点，长 1.3—2 厘米，稀超过 2 厘米，外面略被疏柔毛或近无毛，内面离冠筒基部 2.5—3 毫米有斜向连续的小疏柔毛毛环，冠筒向上渐膨大，稍向上弯，比花萼长约 2 倍，至喉部宽约 6 毫米，冠檐二唇形，上唇直伸，近圆形，长约 5.5 毫米，宽 5 毫米，先端微凹，下唇 3 裂，中裂片扇形，长 3 毫米，宽 5.5 毫米，边缘波状，侧裂片近半圆形，宽 2.5 毫米。能育雄蕊伸至上唇片之下，花丝扁平，无毛，长约 4 毫米，药隔长约 4 毫米，弯成弧形，中部关节处略被小疏柔毛或近无毛，上下臂近等长，下臂较瘦小，先端横生药室，药室先端联合；退化雄蕊短小，长约 1 毫米。花柱略伸出花冠，先端不相等 2 浅裂，后裂片不明显。花盘前方稍膨大。成熟小坚果未见。

产云南西北部；生于林下或林缘，海拔 2800—3400 米。模式标本采自云南德钦。

18. 裂萼鼠尾草

Salvia schizocalyx Stib. in Act. Hort. Göthob. 9: 123. 1934

多年生草本；根粗厚，下伸。茎连花序高约 45 厘米，单一或少数，上升或直立，不

图版 21: 1—3. 雪山鼠尾草 (原变种) *Salvia evansiana* Hand.-Mazz. var. *evansiana*, 1. 植株下部; 2. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 3. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。4—7. 短冠鼠尾草 *Salvia brachyloma* Stib., 4. 植株下部; 5. 植株上部, 示花序; 6. 花萼纵剖, 内面观, 兼示雌蕊; 7. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。(蒋杏墙绘)