

形,长1.2—1.5厘米,口部宽约为长之半至近相等,满布无柄腺体,主要沿脉上被长而开展的疏柔毛,2唇裂约达上部1/3,上唇近圆形,具3脉,顶端具3齿,齿长0.5—1毫米,锐尖,中齿最小,下唇2齿,齿卵状三角形,长约4毫米,锐尖。花冠筒自花萼稍伸出或为其长1.5倍,上部渐腹状增大,口部宽约8毫米,前伸,外面近无毛,内面具疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇长约5毫米,直伸,几裂至基部,裂片卵圆形,近锐尖,被白色小长柔毛,边缘变无毛,下唇与上唇近等长,3裂,侧裂片卵圆状三角形,无毛,中裂片近圆形,全缘。药隔小,长2—3毫米,弯曲,无毛,下药室顶端不联合。退化雄蕊小,顶端不规则增大。(标本未见,摘自原描写)

产云南西北部;生于林内,海拔3800—4275米。模式标本采自云南宁蒗。

系5. 钟萼鼠尾草系——Ser. Campanulatae C. Y. Wu in Addenda 581.

叶几乎全部为茎生,宽卵圆形或近圆形,宽与长近相等(比例约1:1)。花序疏松,圆锥状,多分枝。花冠筒长为花萼的2倍,自基部向上弯曲。

24. 钟萼鼠尾草

Salvia campanulata Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**: 67. 1830; Benth. Labiat. Gen. et Sp. 220. 1833; et in DC. Prodr. **12**: 276. 1848; Hook. t. Fl. Brit. Ind. **4**: 654 1885; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 163. 1915.

24a. 钟萼鼠尾(原变种) 图版14:1—5

var. **campanulata**

多年生草本;根茎粗壮,密被卵圆状披针形的褐色鳞片,向下生出粗壮条状根,其下有纤维状须根。茎直立,高43—80厘米,上部分枝,被具节长柔毛。叶片大型,心形或卵状戟形,长4—18厘米,宽3.5—13.5厘米,先端渐尖,基部心形或戟形,边缘具缺刻状不整齐的重圆齿,薄纸质,上面被紧贴柔毛,下面沿脉上被疏柔毛或短柔毛;叶柄长(1)3—25厘米,基出叶叶柄最长,茎生叶叶柄向上渐短,密被长柔毛。轮伞花序2—6花,疏离,组成宽大顶生总状圆锥花序;苞片卵圆形,长4—9毫米,先端渐尖,基部宽楔形,全缘,两面被疏柔毛,边缘具长柔毛及腺点;花梗长2—5毫米,与花序轴密被长柔毛及具腺疏柔毛。花萼钟形,长1.3厘米,外面被长柔毛及具腺疏柔毛,其间混生稀疏黑褐色腺点,内面满布微硬伏毛,边缘被小缘毛,二唇形,上唇短而宽三角形,长3毫米,宽10毫米,先端锐尖,下唇与上唇等长,宽约9毫米,具2短齿,齿三角形,锐尖。花冠黄色,长2.7厘米,外面在上唇被长柔毛余部近无毛,内面离基部约5毫米有近水平向的疏柔毛毛环,冠筒长约2厘米,基部筒状,宽约3毫米,在毛环上渐