

弯且渐宽大,至喉部宽达 8 毫米,冠檐二唇形,上唇卵圆形,长约 7 毫米,宽 5 毫米,稍穹窿状,先端微凹,下唇长 1—1.2 厘米,宽 1.2 厘米,斜平展,3 裂,中裂片倒心形,长 4 毫米,宽 8 毫米,先端微凹,基部略收缩,侧裂片三角状卵圆形,宽 3 毫米。能育雄蕊伸至上唇,微露出或不伸出,花丝长 6.5 毫米,药隔长 10 毫米,中部关节处略被疏柔毛,上臂长约 6 毫米,下臂长约 4 毫米,靴形,末端的药室互相联合。花柱略伸出花冠外,先端不相等 2 浅裂,后裂片较短。花盘浅杯状。小坚果长倒卵圆形,褐色,光滑无毛。花期 7—9 月。

产云南西北部;生于林缘,海拔约 2300 米。锡金,尼泊尔,印度北部也有。模式标本采自尼泊尔。

24b. 截萼变种

var. **codonantha** (Stib.) Stib. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **39**: 180. 1936——*Salvia codonantha* Stib. in Act. Hort. Götthob. **9**: 127. 1934; in Hand.-Mazz Symb Sin. **7**: 928. 1936.

这一变种与原变种不同在于叶除上面脉上多少密被疏柔毛及边缘具缘毛外,两面近无毛;花萼浅 2 裂或近截形;苞片先端渐尖或锐尖。

产云南西北部;生于沟边杂木林内或山坡路旁草丛中,海拔 2800—3800 米。缅甸东北部也有。模式标本采自云南碧江、怒江边。

24c. 裂萼变种

var. **fissa** Stib. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **39**: 179. 1936.

这一变种与原变种不同在于花萼明显二唇形,上缘长 10—12 毫米,下缘长 12—15 毫米,下唇二齿,齿三角形,长约 5 毫米。

产云南西部。锡金,印度北部也有。模式标本采自印度。

24d. 微硬毛变种

var. **hirtella** Stib. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **39**: 179. 1936

这一变种与原变种不同在于花萼二唇形;叶和茎被微硬毛;苞片尾尖。

产西藏南部,云南西北部;生于阴蔽谷地,海拔约 2800 米。不丹,锡金,尼泊尔,印度北部也有。模式标本采自锡金。

25. 锡金鼠尾草

Salvia sikkimensis Stib. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **39**: 177. 1936; Mukerj. Lab. Ind. **115**. 1940; Murata in Act. Phytotax. Geobot. **24**: 88. 1969; in Hara, Fl. E. Himal 2nd Rep. **117** 1971