

Salvia handelii Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 129, f. 2a—b. 1934.

多年生草本,高 50—80 厘米;根粗大,下行,密被多数丝状纤维。茎 1—2, 上升, 单一,略粗,具四槽,具少数叶,被短小柔毛或变无毛。叶具长柄,宽大,宽卵状三角形或近圆形,长 8—19 厘米,宽与长相等或至其长 1/2,先端锐尖或近钝,基部心形或戟形,基片常近锐尖,边缘为不整齐的重圆齿或近牙齿状,齿先端具小尖头,草质,近同色,具缘毛,上面被短柔毛,下面特别在脉上被开展疏柔毛,无腺点;叶柄长为叶片 2—3 倍,初被淡黄短绒毛,其后变无毛。花序顶生,不分枝或圆锥状分枝,由具二花疏离的轮伞花序组成;序轴稍密被污黄或淡褐色疏柔毛及混生的腺毛;苞片宽卵形或近圆形,与花萼近等长或为其长的 1/2,先端骤短渐尖或常具二小尖,基部楔状渐狭,全缘或最下部苞片边缘具齿。花萼宽钟形,萼口截形,几不二唇形,着艳色,长宽 10—15 毫米,沿肋及边缘被具腺的长疏柔毛,余部疏被无柄的腺点。花冠绿白色,有青紫色斑点,长 18—22 毫米,冠筒基部短筒形,其上腹状增大,超出花萼为其长 1/2 以下,外面近无毛,内面在子房上方极密生白色疏柔毛毛环,冠檐二唇形,上唇圆形,短,宽 3—4 毫米,先端具深凹(有时几达基部),密被白色短柔毛,下唇近等长,3 裂,侧裂片卵圆形,具小缘毛,中裂片圆形,波状。药隔短,弧形,二下臂药室顶端联合。(标本未见,摘自原描写)

产四川西南部;生于石灰岩草坡及林中,,海拔 3800—3950 米。模式标本采自四川木里。

27. 林华鼠尾草

Salvia hylocharis Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**: 236, f. 3. 1912; Stib. in Act. Hort. Göthob. **9**: 130, f. 3a—b. 1934——*Salvia forrestii* Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**: 235. 1912——*Salvia campanulata* auct. non Wall.: Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**: 163. 1915, p. p.; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 168. 1929, p. p.

27a. 林华鼠尾草(原变种) 图版 23

var. **hylocharis**

多年生草本;根茎肥厚,覆盖卵圆状披针形鳞片,向下生出粗约 1 厘米的条状根。茎 1—2, 高 45—90 厘米,不分枝,四棱形,被长柔毛。叶片卵圆状三角形或卵圆状戟

图版 23: 林华鼠尾草(原变种) **Salvia hylocharis** Diels var. **hylocharis**, 1. 植株上部,示花序; 2. 花萼纵剖,内面观,兼示苞片及子房; 3. 花冠纵剖,内面观,示毛环和联合的下臂。(蒋杏墙绘)