

长约 4.5 毫米,宽约 2.1 毫米,先端微缺,下唇 3 裂,中裂片较大,长约 2 毫米,宽达 6 毫米,先端微缺,边缘波状,侧裂片卵圆形,宽 1—1.5 毫米。能育雄蕊 2,外伸,花丝长约 3 毫米,药隔长约 5 毫米,上臂较长,长 3.5 毫米,略弯曲,下臂短而扁,顶端联合。退化雄蕊线形,短小。花柱外伸,长约 13 毫米,先端 2 裂,前裂片较长。花盘前方略膨大。小坚果椭圆形,长 1.3 毫米,直径 0.7 毫米,淡棕色。花期 6—8 月。

产浙江,安徽,江西,湖南,广西,广东;生于山坡、阳处草丛及路边,海拔 100—800 米。模式标本采自广东广州。

广西用全草入药,主治菌痢,腹泻,腹痛,感冒。

52. 贵州鼠尾草

Salvia cavaleriei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**: 422. 1910; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 164. 1913; Stib. in Act. Hort. Göthob. **10**: 60. 1935 —*Salvia betonicoides* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**: 421. 1910 —*Salvia marchandii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **12**: 533. 1913.

52a. 贵州鼠尾草(原变种) 图版 29:1—4

var. *cavaleriei*

一年生草本;主根粗短,纤维状须根细长,多分枝。茎单一或基部多分枝,高 12—32 厘米,细瘦,四棱形,青紫色,下部无毛,上部略被微柔毛。叶形状不一,下部的叶为羽状复叶,较大,顶生小叶长卵圆形或披针形,长 2.5—7.5 厘米,宽 1—3.2 厘米,先端钝或钝圆,基部楔形或圆形而偏斜,边缘有稀疏的钝锯齿,草质,上面绿色,被微柔毛或无毛,下面紫色,无毛,侧生小叶 1—3 对,常较小,全缘或有钝锯齿,上部的叶为单叶,或裂为 3 裂片,或于叶的基部裂出 1 对小的裂片;叶柄长 1—7 厘米,下部的较长,无毛。轮伞花序 2—6 花,疏离,组成顶生总状花序,或总状花序基部分枝而成总状圆锥花序;苞片披针形,长约 2 毫米,先端锐尖,基部楔形,无柄,全缘,带紫色,近无毛;花梗长约 2 毫米,与花序轴略被微柔毛。花萼筒状,长 4.5 毫米,外面无毛,内面上部被微硬伏毛,二唇形,唇裂至花萼长 1/4,上唇半圆状三角形,全缘,先端锐尖,下唇比上唇长,半裂成 2 齿,齿三角形,锐尖。花冠蓝紫或紫色,长约 8 毫米,外被微柔毛,内面在冠筒中部有疏柔毛毛环,冠筒长 5.5 毫米,略伸出,自基部向上渐宽大,基

图版 33: 1—4. **红根草** *Salvia prionitis* Hance, 1. 植株下部; 2. 植株上部, 示花序; 3. 花萼纵剖, 内面观, 兼示子房; 4. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环和联合的下臂。5—7. **河南鼠尾草** *Salvia honania* L. H. Bailey, 5. 植株上部; 6. 花萼纵剖, 内面观, 示毛环; 7. 花冠纵剖, 内面观, 示毛环、联合的下臂和边缘流苏状的下唇中裂片。(蒋杏墙绘)