

部宽 1 毫米,至喉部宽约 2 毫米,冠檐二唇形,上唇长圆形,长约 3.5 毫米,宽约 2 毫米,先端微缺,下唇与上唇近等长,宽达 4 毫米,3 裂,中裂片倒心形,先端微缺,侧裂片卵圆状三角形。能育雄蕊 2,伸出花冠上唇之外,花丝长 2 毫米,药隔长 4.5 毫米,上臂长 3 毫米,下臂长 1.5 毫米,药室退化,增大成足形,顶端相互联合。退化雄蕊短小。花柱微伸出花冠,先端不相等 2 裂,后裂片较短。花盘前方略膨大。小坚果长椭圆形,长 0.8 毫米,黑色,无毛。花期 7—9 月。

产四川,贵州,广西及广东;生于多岩石的山坡上、林下、水沟边,海拔 530—1300 米。模式标本采自贵州平坝。

52b. **紫背变种** 女菀 (植物名实图考)

var. **erythrophylla** (Hemsl.) Stib. in Act. Hort. Göthob. 10: 60. 1935——*Salvia japonica* Thunb. var. *erythrophylla* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 284. 1890——*Salvia japonica* Thunb. f. *erythrophylla* (Hemsl.) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2: 173. 1929.

这一变种与原变种不同在于叶大多数基出,常为 1—2 对羽片的羽状复叶,稀为单叶,边缘具整齐的粗圆齿或圆齿状牙齿,下面紫色,两面被疏柔毛,稀近无毛,叶柄常比叶片短,常被开展疏柔毛;花暗紫或白色。

产湖北,四川,陕西,湖南,广西及云南;生于林下、路旁、草坡,海拔 700—2000 米。等模式标本采自湖北巴东及四川巫山。

52c. **血盆草** (四川峨眉、贵州铜仁、湖南) 罗汉草、破罗子、破落子、单叶波罗子(四川峨眉),翻背红(四川南川),鼠雀菜、退节草(四川忠县),气喘药(四川叙永),红薄洛(四川屏山),红肺筋、红五匹(四川),反背红、朱砂草、叶下红(贵州、湖南),红青菜(贵州剑河)

var. **simplicifolia** Stib. in Act. Hort. Göthob. 10: 61. 1935——*Salvia delavayi* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 220. 1911, e descr.——*Salvia tsaiiana* Stib. in 静生汇报 8: 53. 1937, *syn. nov.* e isoholotypo.

这一变种与原变种不同在于叶全部基出或稀在茎最下部着生,通常为单叶,心状卵圆形或心状三角形,稀三出叶,侧生小叶小,叶片长 3.5—10.5 厘米,宽约为长之 1/2,先端锐尖或钝,具圆齿,无毛或被疏柔毛,叶柄常比叶片长,无毛或被开展疏柔毛;花序被极细贴生疏柔毛,无腺毛;花紫色或紫红色。

产湖北,湖南,江西,广东,广西,贵州,云南及四川;生于山坡、林下或沟边,海拔 460—2700 米。模式标本未指定。