

全草入药,主治吐血,血崩,衄血,刀伤出血,血痢,产后寒等症。叶又可外敷疮毒。

53. 胶质鼠尾草

Salvia glutinosa Linn. Sp. Pl. 26. 1753; Benth. in DC. Prodr. **12**: 276. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:653. 1885; Stib. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **39**: 183. 1936; Pobed. in Fl. URSS **21**: 281. 1954——*Salvia nubicola* Wall. Pl. Asiat. Rar. **1**: 68. 1830.

多年生草本。茎直立,高1—1.25米,单一,全体被有下部扁平的具节毛,在花序部分混生有腺毛。叶卵圆状长圆形,两面被稀疏的柔毛或无毛,仅沿脉上被紧贴的具节毛,叶柄比叶片长或与叶片等长,稀有比叶片短,密被短柔毛;在花序分枝基部的苞叶比茎叶小,长2—4厘米,椭圆形或长圆形,先端长渐尖,基部心形或楔形,边缘具牙齿,具短柄或近无柄,被短柔毛,如同其他的叶。轮伞花序6花,彼此相距1—2厘米,由10—12个组成单一的顶生总状花序,或具1—2对分枝的顶生总状圆锥花序;苞片卵圆形或椭圆形,先端长渐尖,无柄,比花萼短,向下外弯,下面及沿边缘被多数而纤细的短柔毛及混生具腺的毛,小苞片椭圆形,边缘有具腺缘毛;花梗长约等于花萼长之半,与花序轴密被具腺柔毛。花萼长10—12毫米,外面被短柔毛及长腺毛,内面在上半部或近至基部被短的硬毛,在紧靠基部被稀疏的毛,二唇形,上唇半圆形,比下唇短,先端具3个极短的小齿,下唇深裂成2齿。花冠黄色,在冠檐上有美丽而细的花纹及斑点,稀有紫色,长3—4厘米,比花萼长,冠筒极伸出,外被腺毛,内面具纤细的单毛,冠檐二唇形,上唇镰刀状,两侧压扁,稍向后弯,先端微凹,外被具腺短柔毛,下唇外被短柔毛,3裂,中裂片宽倒卵圆形,比侧裂片稍短,边缘外卷,具深齿,侧裂片横向椭圆状长圆形,外卷。能育雄蕊2,花丝稍短于药隔,上臂长约为下臂2—3倍,上药室长达1厘米,与上臂近等长,下臂的药室不发育,变形,呈半圆形,边缘具胼胝质,借此彼此联合。花柱伸出花冠,先端极不相等2裂。小坚果椭圆形,长3毫米,褐色,具有较大的黑网纹。花期6—8月。(标本未见,摘自原描写)

产西藏;自西亚及南欧,经阿富汗,巴基斯坦,至印度,锡金及不丹也有。模式标本采自欧洲。

系2. 河南鼠尾草系——*Ser. Honaniae* C. Y. Wu in Addenda 582.

叶为三出叶稀单叶。花冠下唇中裂片具2小裂片,裂片边缘流苏状,冠筒内面有疏柔毛毛环。花萼内面有长柔毛毛环。