

无毛外满布微硬伏毛,二唇形,唇裂至花萼长 $1/4$,上唇三角形,长2毫米,宽3毫米,先端锐尖,全缘,下唇比上唇稍长,半裂成2齿;齿三角形,先端渐尖。花冠粉红色,长11毫米,外被短柔毛,内面无毛,冠筒筒状,长达8毫米,基部宽1.25毫米,直伸,至喉部宽1.5毫米,冠檐二唇形,上唇直立,长圆形,长约3毫米,宽近2毫米,先端微凹,下唇长3毫米,宽4毫米,3裂,中裂片最大,倒心形,长宽约2毫米,先端微凹,侧裂片斜卵圆形,宽1.2毫米。能育雄蕊2,花丝长1.3毫米,药隔甚短,长约0.3毫米,上下臂近相等,上臂具药室,二下臂稍短,不育,不相联合。花柱与花冠近等长,先端2浅裂,前裂片较长。花盘环状。小坚果长椭圆形,长约3毫米,青黄色,无毛。花、果期1—2月。

产云南东部;生于路旁,海拔约1800米。模式标本采自云南路南。

57. 南川鼠尾草

Salvia nanchuanensis Sun in Addenda 582——*Salvia japonica* Thunb. var. *parvifoliola* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 285 1890, p. p. min. quoad Henry 3772——*Salvia japonica* Thunb. var. *pinnata* Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 558 1900; Stib. in Act. Hort. Göthob. **10**: 68. 1935——*Salvia japonica* Thunb. var. *fortunei* (Benth.) Kudo f. *pinnata* (Diels) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 173. 1929——*Salvia japonica* Thunb. var. *parvifoliola* auct. non Hemsl.: Diels in l. c.——*Salvia plectranthoides* auct. non Griff.: Stib. in Act. Hort. Göthob. **10**: 58. 1935, p. p. min. quoad Wilson Veitch. Exp. 203a.

57a. 南川鼠尾草(原变种) 图版 36:6—10, 37:1—7

var. **nanchuanensis**

一年生或二年生草本;根肥厚,狭锥形,长2—6(15)厘米,径3—4毫米,须根多数,丝状延长。茎直立,高20—65厘米,单生或少数丛生,不分枝,钝四棱形,具沟,密被平展白色长绵毛。叶茎生,大都为一回奇数羽状复叶,间有二回裂片,叶柄长1.5—5.5厘米,腹凹背凸,密被白色绵毛,小叶卵圆形或披针形,长2—6.5厘米,宽0.7—2.3厘米,先端钝或渐尖,基部偏斜,圆形或心形,边缘有圆齿或锯齿,薄纸质,上面绿色,

图版 37: 1—6. 南川鼠尾草(原变型) *Salvia nanchuanensis* Sun var. *nanchuanensis* f. *nanchuanensis*, 1. 植株上部,示花序; 2. 茎生叶; 3. 花, 侧面观; 4. 花萼纵剖, 内面观; 5. 花冠纵剖, 内面观; 6. 雌蕊。 7. 南川鼠尾草居间变型 *Salvia nanchuanensis* Sun var. *nanchuanensis* f. *intermedia* Sun, 7. 茎生叶。 8. 南川鼠尾草蕨叶变种 *Salvia nanchuanensis* Sun var. *pteridifolia* Sun, 8. 茎生叶。(曾孝濂绘)