

相等 2 裂, 前裂片较长。花盘等大。小坚果椭圆形, 长约 3.5 毫米, 暗褐色, 顶端具不规则极少数的绉折突起, 边缘或稜具狭翅, 光滑。花期 3—10 月。

原产巴西, 我国各地庭园中广泛栽培, 作观赏用, 本种为一美丽的盆栽花卉, 花有各种颜色, 由大红至紫, 甚至有白色的。

亚系 2. 筒花亚系——Subser. *Tubiflorae* Benth. in DC. *Prodr.* 12:338. 1848; Briq. in I. c.

草本。花冠钟状管形, 深红色, 冠筒直立。

62. 朱唇(广州植物志) 小红花(云南蒙自)

Salvia coccinea Linn. Mant. Pl. 1:88. 1767; Juss. ex Murr. in Comm. Gothing 1:86. t. l. 1778; Benth. in DC. *Prodr.* 12:343. 1848.

一年生或多年生草本; 根纤维状, 密集。茎直立, 高达 70 厘米, 四棱形, 具浅槽, 被开展的长硬毛及向下弯的灰白色疏柔毛, 单一或多分枝, 分枝细弱, 伸长。叶片卵圆形或三角状卵圆形, 长 2—5 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 先端锐尖, 基部心形或近截形, 边缘具锯齿或钝锯齿, 草质, 上面绿色, 被短柔毛, 下面灰绿色, 被灰色的短绒毛; 叶柄长 0.5—2 厘米, 被下向的疏柔毛及开展的长硬毛或仅被绒毛状柔毛。轮伞花序 4 至多花, 疏离, 组成顶生总状花序; 苞片卵圆形, 比花梗长, 先端尾状渐尖, 基部圆形, 上面无毛, 下面被疏柔毛, 边缘具长缘毛; 花梗长 2—3 毫米, 与花序轴密被白色向下的短疏柔毛。花萼筒状钟形, 长 7—9 毫米, 外被短疏柔毛及微柔毛, 其间混生浅黄色腺点, 内面在中部及以上被微硬伏毛, 二唇形, 上唇卵圆形, 长约 2.5 毫米, 宽 3 毫米, 全缘, 先端具小尖头, 边缘被小缘毛, 下唇与上唇近等长, 深裂成 2 齿, 齿卵状三角形, 先端锐尖。花冠深红或绯红色, 长 2—2.3 厘米, 外被短柔毛, 内面无毛, 冠筒长约 1.6 厘米, 基部宽 1.5 毫米, 斜向上升, 向上渐宽, 至喉部宽达 4 毫米, 冠檐二唇形, 上唇比下唇短, 伸直, 长圆形, 长约 6 毫米, 宽约 4 毫米, 先端微凹, 下唇较上唇稍长, 长 7 毫米, 宽 8.5 毫米, 3 裂, 中裂片最大, 倒心形, 长 5 毫米, 宽 8.5 毫米, 先端微缺, 边缘波状, 侧裂片卵圆形, 短, 宽 2 毫米。能育雄蕊 2, 伸出, 花丝长约 4 毫米, 药隔长约 1.5 厘米, 极纤细, 近伸直, 下臂药室不育, 顶端彼此分离, 上下臂近等长。花柱伸出, 先端稍增大, 2 裂, 后裂片极小, 不明显。花盘平顶。小坚果倒卵圆形, 长 1.5—2.5 毫米, 黄褐色, 具棕色斑纹。花期 4—7 月。

原产美洲, 在我国也有栽培, 云南南部及东南部已逸为野生。

花美观, 供观赏用; 全草又可入药, 治血崩, 高热, 腹痛不适。

亚属 4. 鼠尾草亚属——Subg. *Allagospadonopsis* Briq. in Engl. u. Prantl. Nat

Pflanzenfam. 4, 3a:285. 1897 [incl. sect. *Allagospadon* Maxim. et sect. *Gymnosphace* (Benth.) Briq.]—Sect. *Notiosphace* Benth. Labiat. Gen. et Sp. 309. 1833, p. p.; in DC. Prodr. 12:354 1848, p. p.—Subg. *Leonia* sect. *Notiosphace* (Benth.) Bunge ex Briq. in l. c. p. p.; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. 2:169. 1929, p. p. maj.—Sect. *Vernales* Kudo in l. c. 174. 1929—Subg. *Gymnosphace* (Benth.) Stib. in Act. Hort. Göthob. 9:105, 144. 1934.

多年生草本。叶为单叶或三出叶或通常为一回羽状复叶至四回羽状复叶。花冠筒内面具疏柔毛毛环或全面被小疏柔毛或无毛。雄蕊分离。药隔与花丝近连续，下臂不育，短，钻形或下部稍增大。

系 1. 舌瓣鼠尾草系——Ser. *Ligulilobae* C. Y. Wu in Addenda 583.

叶为单叶。花序穗状，间断，偏向一侧。花萼上唇有靠拢的3个短尖头，内面在上部被微硬伏毛。花冠筒直伸，渐增大，内面近基部有疏柔毛毛环，下唇中裂片舌状。

63. 舌瓣鼠尾草 图版 43: 4—6

Salvia liguliloba Sun in 科学社生物所论文集 10:29, t. 5. 1935; 中国植物学杂志, 3:866, pl. color. 1936.

一年生直立草本；根纤维状，密集。茎直立，高30—40(70)厘米，单一或略有分枝，钝四稜形，具槽及条纹，紫绿色，稜上略被小疏柔毛。叶有基出叶及茎生叶，基出叶具长柄，柄长2—3厘米，腹凹背凸，密被倒向小疏柔毛。叶片长圆形，长2—4.5厘米，宽1.2—3厘米，先端钝，基部心形，边缘具不整齐而不明显的细圆齿状锯齿，草质，上面绿色带紫，下面紫色，上面全面散布糙伏毛，下面仅沿脉被短柔毛余部无毛，茎生叶约3对，下部一对具长柄，长达3厘米，向上变短，最上一对具短柄或无柄，叶片披针形，长3—7(11)厘米，宽1—2.2(4.2)厘米，先端渐尖或长渐尖，基部圆形，其余均同基出叶。轮伞花序2—12花，疏离，在茎顶组成偏向一侧的总状花序，此花序长10—25厘米，有时在基部具1—2短花枝，因而组成总状圆锥花序；苞片线状披针形，长约5毫米，宽0.5毫米，先端渐尖，具缘毛；花梗长约2.5毫米，与花序轴被具腺长柔毛。花萼钟形，长约7毫米，外面被长柔毛，内面在中部以上被微硬伏毛，二唇形，上唇三角形，长2毫米，宽3毫米，先端有靠拢的3个短尖头，下唇与上唇近等长，半裂成2齿，齿三角形，先端锐尖。花冠淡红色，外面被疏柔毛，在唇片尤为密集，内面基部近子房处有明显的疏柔毛毛环，冠筒长1.8厘米，直伸，基部宽2毫米，至毛环处略增大，向上渐增大，至喉部宽达6毫米，冠檐二唇形，上唇直伸，长圆形，长约4毫米，宽