

3 毫米,先端微缺,下唇轮廓三角形,长 4.5 毫米,宽 8 毫米,3 裂,中裂片较小,舌状,长椭圆形,全缘,长 2 毫米,宽 1.5 毫米,侧裂片较大,三角形,高 2 毫米,宽 4 毫米。能育雄蕊 2,伸至上唇下,着生于冠筒上部 1/6 处,花丝长 2 毫米,无毛,直立,药隔长 4.5 毫米,直伸,无毛,上臂长 2.5 毫米,较瘦小,花药线形,长 2.6 毫米,一室,下臂长 2 毫米,顶端粗而扁,具横生药室痕迹,二下臂分离。退化雄蕊棍棒形,长约 0.5 毫米。花柱稍伸出花冠,长 2.5 厘米,先端 2 浅裂,前裂片较长。花盘前方稍隆起。小坚果椭圆形,长 2 毫米,直径 0.8 毫米,褐色。花期 6 月。

产浙江,安徽;生于山坡林缘路旁,海拔约 800 米。模式标本采自浙江东天目山。

64. 黄山鼠尾草

Salvia chienii Stib. in Act. Hort. Göthob. 10:62. 1935——*Salvia anhweiensis* Migo in Journ. Shangh. Sci. Inst. Sect. 3, 4:159. 1939.

64a. 黄山鼠尾草(原变种)

var. **chienii**

多年生草本;根茎匍匐,其上密生多纤维状的须根。茎直立,高 20—45 厘米,单生,具分枝,钝四棱形,具槽,密被下向的短疏柔毛。叶有单叶及复叶,复叶根出和茎生,具柄,柄长 1.5—6 厘米,下部的较长,腹平背凸,密被向下的短疏柔毛,小叶 3 枚,顶生小叶较大,卵圆形至卵圆状披针形,长 4—14 厘米,宽 1.2—4 厘米,先端急尖至渐尖,边缘具圆齿或钝锯齿,有时具重圆齿,上面绿色,被粗糙的小疏柔毛,下面淡绿或紫色,沿脉被小疏柔毛,余部被稀疏的小腺点,侧生小叶比顶生小叶小,长 1—4 厘米,宽 0.8—2.5 厘米,其余与顶生小叶相同,小叶柄长 1—3 毫米;单叶叶片卵圆状披针形,茎生,长 1.5—5.5 厘米,宽 0.5—2.5 厘米,其余小叶相同,几无柄。轮伞花序 3—7 花,疏离,组成顶生或腋生偏向一侧的总状花序或总状圆锥花序;苞片披针形,长约 5 毫米,先端渐尖,基部近圆形,全缘,两面无毛,边缘具缘毛。花萼筒形,长约 6 毫米,紫红色,外疏被具腺小疏柔毛,内面在上半部被微硬伏毛,萼筒长 4.5 毫米,内面上半部紫红色,萼檐二唇形,上唇宽三角形,全缘,具 3 脉,侧脉外边有狭翅,下唇半裂成 2 齿,齿三角形,先端锐尖。花冠长 1 厘米,紫色,外面被短柔毛,内面基部在子房上方有明显或不明显的斜向毛环,喉部内面前方被髯毛,冠筒长管状,长约 9 毫米,向外直伸,基部宽 2 毫米,向上渐宽,至喉部宽 3 毫米,冠檐二唇形,上唇长圆形,直伸,长约 2.5 毫米,宽 2 毫米,先端微缺,下唇比上唇伸长,长 3 毫米,宽 4 毫米,3 裂,中裂片较大,半圆形至长圆形,先端微缺,全缘,侧裂片长圆形。能育雄蕊 2,着生在花冠筒的喉部,稍外伸,分离,花丝长约 1 毫米,无毛,药隔长约 2.5 毫米,上臂长约 2 毫米,下