

臂长约 0.5 毫米,药室不育,分离。花柱与花冠等长,先端近相等 2 浅裂,前裂片稍长。小坚果黄褐色,长约 2 毫米,宽 1 毫米,光滑。花期 7 月。

产安徽;生于路旁或山坡。模式标本采自安徽黄山。

64b. 婺源变种

var. **wuyuania** Sun in Addenda 583.

这一变种与原变种不同在于茎、叶片及叶柄均无毛,花冠长约 1.3 厘米,下唇中裂片长圆形,冠筒内具斜毛环。

产江西东北部;生于路旁或溪旁,海拔约 750 米。模式标本采自江西婺源。

系 2. 佛光草系——Ser. *Substoloniferae* C. Y. Wu in Addenda 583.

茎常在基部匍匐生根或上升。基出叶为单叶,茎生叶几全部为三出叶。花萼上唇先端截形,萼筒内面无毛环。花冠筒内面无毛环,下唇中裂片边缘浅波状。

65. 佛光草(四川峨眉) 小灯台草、小铜钱草(四川平安),湖广草(四川),盐咳药、湖广草(贵州绥阳),小退火草(贵州正安),蔓茎鼠尾(中国植物学杂志,第三卷)

图版 39:1—4

Salvia substolonifera Stib. in Act. Hort. Göthob. 9: 138. 1934; in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 929, t. 14, f. 10. 1936.

一年生草本;根须状,簇生。茎少数,丛生,基部上升或匍匐,高 10—40 厘米,不分枝或少分枝,四棱形,具浅槽,被短柔毛或微柔毛。叶有根出及茎生,根出叶大多数为单叶,茎生叶为单叶或三出叶或 3 裂,单叶叶片卵圆形,长 1—3 厘米,宽 0.8—2 厘米,先端圆形,基部截形或圆形,边缘具圆齿,膜质,两面近无毛或仅沿脉上被微硬毛,三出叶或三裂时,小叶卵圆形,顶生的较大,卵圆形至近圆形,侧生的比顶生的小许多,小叶柄长 1—4 毫米或至无柄,被微柔毛;叶柄长 0.6—6 厘米,扁平,被微柔毛。轮伞花序 2—8 花,在下部疏离上部稍密集组成长 7—15 厘米的顶生或腋生总状花序,有时顶生总状花序基部具 2 短分枝,因而组成叉状的总状圆锥花序;苞片长卵圆形,长 3—5 毫米,先端渐尖或锐尖,基部楔形,全缘,两面近无毛;花梗长约 2 毫米,与花序轴密被微硬毛及具腺疏柔毛。花萼钟形,花时长 3—4 毫米,果时增大,长达 7 毫米,外面被微柔毛及腺点,内面近无毛,二唇形,上唇梯形,顶端截形,全缘或具不明显二齿,下唇比上唇稍长,深裂成 2 齿,齿卵状三角形,先端锐尖。花冠淡红或淡紫色,细小,长 5—7 毫米,外面略被微柔毛,内面无毛环或具毛环(根据原描写),冠筒近外伸或稍外伸,钟形,长 3—4 毫米,基部筒状,宽约 1 毫米,至子房部分稍缢缩,其上渐