

伸,长1毫米,先端具2圆裂片,下唇伸长,长2.5毫米,宽3.5毫米,3裂,中裂片最大,顶端2浅裂,裂片卵圆形,全缘,侧裂片卵圆形。能育雄蕊2,近外伸,花丝长约1.5毫米,药隔长约3毫米,纤细,下臂较短,约为上臂的1/2,分离。花柱内藏,先端近相等2浅裂,裂片线形,弯曲。花盘近等大。小坚果长圆形,长约1.5毫米,宽约0.5毫米,浅褐色。花、果期4—5月。

产台湾;生于山麓。模式标本采自台湾。

74b. 羽叶变种 图版44:4—6

var. **pinnata** (Hayata) C. Y. Wu, comb. nov. — *Salvia scapiformis* Hance var. *pinnata* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **22**: 312, t. 17. 1906; in *ibid.* **25**: 182. 1908; Matsum. et Kudo in Bot. Mag. Tokyo **26**: 299. 1912; Kudo in *ibid.* **28**: 253. 1914 — *Salvia keitaoensis* Hayata. Icon. Pl. Formos. **8**: 96, f. 34, a—d. 1919 — *Salvia scapiformis* Hance f. *keitaoensis* (Hayata) Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 175. 1929.

这一变种与原变种不同在于叶为一回羽状复叶,侧生小叶1—4对。

产台湾(溪头,太平山)。模式标本采自台湾。

75. 铁线鼠尾草

Salvia adiantifolia Stib. in Act. Hort. Göthob. **10**: 64. 1935.

多年生草本;根茎上升或近匍匐,密生纤维状侧根及丝状须根。茎单生或少数丛生,上升或直立,高30—60厘米,纤细,四棱形,具槽,被微小向下的疏柔毛或微柔毛。叶多为基出或近基出,茎生的通常1对,长3—14厘米,具2—3对小叶的奇数羽状复叶或至三回羽状复叶,小叶形状多变,顶生的常常最大,侧生的最小,长0.5—4厘米,扇形或菱形或披针形或卵圆形,先端钝或锐尖或短渐尖,基部楔状渐狭或圆形或近心形但常偏斜,无柄或具短柄,边缘具圆齿状锯齿或基部常有1—2个裂片,纸质,上面绿色,被稀疏具节平伏毛,下面淡绿色或紫色,沿脉疏被小疏柔毛,余部具腺点;基出叶叶柄长3.5—6.5厘米,茎生叶叶柄长约1厘米,被与茎同一式毛被。轮伞花序4—10花,疏离,彼此相距0.8—2厘米,组成顶生三叉状总状圆锥花序,稀为单生的总状花序;苞片小,披针形,先端尾状渐尖或变锐尖,基部渐狭,全缘,近无毛,与花梗近等长或稍短;花梗长1—2毫米,与花序轴被短疏柔毛。花萼钟形,长4—5.5毫米,外面沿脉略被微柔毛或无毛,内面无毛环,在上半部被微硬伏毛,二唇形,裂至花萼长1/4,上唇半圆形,先端具小尖头,下唇深裂成2齿,齿三角形,先端具刺状尖头。花冠天蓝至白紫色,长7—8毫米,外被具腺短柔毛,内面在冠筒中部有斜向疏柔毛毛环,喉部

被白色疏柔毛,冠筒内藏,筒状,自基部向上渐宽大,至喉部仅宽2毫米,冠檐二唇形,上唇长约2毫米,外弯或近伸直,先端微凹,下唇比上唇稍短,3裂,中裂片最大,先端2浅裂,裂片叉开,顶端具小圆齿,侧裂片近圆形或卵圆形。能育雄蕊2,外伸或不伸出,花丝短,长约1毫米,药隔长约4毫米,上臂比下臂长约2倍,能育,下臂短,不育,分离。花柱伸出,先端不相等2浅裂,前裂片伸长。花盘前方略膨大。花期6月。

产江西,福建,湖南,广西,广东;生于山脚、林下或路旁。模式标本采自江西福建交界宁都及长汀间的黄祖岭。

76. 草莓状鼠尾草

Salvia fragarioides C. Y. Wu, 云南植物志 1:689,图版 169, 3—5. 1976.

多年生草本;根茎匍匐,节上生出多数纤维状须根。茎上升或近直立;高20—30厘米,四棱形,具槽,密被倒向微柔毛,上部无叶或具变小的叶。叶基出或近基出,3裂,顶生小叶菱状卵圆形,长3—4厘米,宽1.5—2厘米,先端钝或锐尖,基部楔形,边缘具粗大有时双重的圆齿状锯齿,草质,上面绿色,主沿脉上较密被糙伏毛,余部散布糙伏毛及微柔毛,下面淡绿色,脉上被糙伏毛,小叶柄长5—10毫米,被糙伏毛及微柔毛,侧生小叶卵圆形,比顶生小叶较小,长1.5—2.5厘米,宽1—1.5厘米,先端钝或锐尖,基部多少偏斜,宽楔形或近圆形,其余同顶生小叶,小叶柄极短,长2—3毫米;叶柄长4.5—9.5厘米,扁平,密被倒向微柔毛。轮伞花序2至多花,疏离,4—6个组成疏松顶生长10—18厘米具总梗的总状花序;苞片及小苞片线形,长1.5—2毫米,先端锐尖,基部渐狭,全缘,被微柔毛;花梗长1.5—2.5毫米,与花序轴密被短柔毛。花萼筒状,长5—8毫米,外面沿脉上被具腺疏柔毛,内面在上半部被微硬伏毛,无硬毛毛环,二唇形,上唇三角形,3脉,2侧脉外面具狭翅,全缘,先端具3个小尖头,下唇深裂成2齿,齿长三角形,先端渐尖。花冠未开放,外面在唇片略被微柔毛,内面无毛。能育雄蕊2,花丝比药隔稍短,药隔的上臂较长,长约为下臂2倍,药室联合,二下臂不育,分离。退化雄蕊短小,先端稍增大。花柱先端2浅裂。花盘近等大。成熟小坚果未见。花期10月。

产云南南部;生于河边岩石上,海拔约800米。模式标本采自云南景洪南线河。

77. 威海鼠尾草

Salvia weihaiensis C. Y. Wu et H. W. Li in Addenda 585.

草本;根长柱形,粗约4毫米。茎直立,连花序在内高25厘米,钝四棱形,具槽,密被疏柔毛。叶基出及茎生,基出叶具柄,柄长2—2.5厘米,扁平,密被疏柔毛,叶片长圆形,长6.5—7厘米,宽3.2—3.7厘米,先端钝或近圆形,基部近截平,边缘具不整