

4. 植株分枝或不分枝,分枝时无明显规律;花冠均较小,长不及1厘米。

5. 茎被稀疏腺短柔毛;叶坚纸质,上面仅沿中脉及侧脉上密被微柔毛,余部近无毛,下面近无毛;轮伞花序生于主茎及分枝顶部,常组成连续的圆锥花序;花萼外面脉上被白色纤毛,余部混生小粒松脂腺体……………11.峨眉风轮菜 *C. omeiense* C. Y. Wu et Hsuan

5. 茎被平展糙硬毛及腺毛;叶纸质,两面被粗硬毛,尤其是下面脉上;轮伞花序圆球形,沿茎及分枝形成宽而多头的圆锥花序;花萼外面脉上被具节长柔毛及腺微柔毛……………1.灯笼草 *C. polycephalum* (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan

3. 植株多茎,铺散式或自基部多分枝,茎多柔弱上升。

6. 花萼短小,长在4毫米以下。

7. 轮伞花序具苞叶;萼筒等宽,外面全无毛或沿脉上有极稀少的毛,内面喉部被小疏柔毛,齿缘被睫毛,上唇3齿果时不向上反折……………10.邻近风轮菜 *C. confine* (Hance) O. Ktze.

7. 轮伞花序不具苞叶;萼筒不等宽,外面沿脉上被短硬毛,余部被微柔毛,内面喉部被稀疏小疏柔毛,齿缘被睫毛,上唇3齿果时向上反折……………9.细风轮菜 *C. gracile* (Benth.) Matsum.

6. 花萼较大,长在4毫米以上。

8. 花冠大,长1.5—2厘米,冠筒十分伸长,长约为花萼的2倍或以上……………6.寸金草 *C. megalanthum* (Diels) C. Y. Wu et Hsuan

8. 花冠较小,长不及1厘米。

9. 轮伞花序密集多花,花在10以上,呈球形;苞片多数,几与萼等长……………2.匍匐风轮菜 *C. repens* (D. Don) Wall.

9. 轮伞花序通常少花,2—8花,不明显呈球形;苞片少数,均短于花萼。

10. 苞片远较花梗为短;花梗伸长,长3—5毫米;叶匙形,略大(1—2.5×0.7—1厘米),上半部具2—6圆齿状锯齿……………3.长梗风轮菜 *C. longipes* C. Y. Wu et Hsuan

10. 苞片长于花梗;花梗长约2毫米;叶卵圆形而小(0.7—1.2×0.5—0.8厘米),在基部或中部以上具2—5极浅的具胼胝尖锯齿……………8.疏花风轮菜 *C. laxiflorum* (Hayata) C. Y. Wu et Hsuan

1. 灯笼草(云南玉溪、四川南川) 山藿香(云南漾濞、贵州遵义),走马灯笼草(云南保山),漫胆草、小益母草(云南大理),脚癣草(云南红河),夏枯草、土防风、绣球草(云南曲靖),楼台草(云南通海),蜂窝草(贵州湄潭),节节草(贵州清镇),第第菜(四川南川),风轮草(四川峨眉),断血流(安徽),土荆芥(江苏),野鱼腥草(广西龙胜),大叶香薷(植物名实图考)

Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsu, 黄山植物的研究,168,1965; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 12(2):198. 1974——*Calamintha*

polycephala Vaniot in Bull. Acad. Internat. Géogr. **14**:183. 1904; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:84. 1934; Symb. Sin. **7**:931. 1936; in Beih. Bot. Centralbl. **56B(3)**:458. 1937——*Calamintha tsacapanensis* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **8**:423. 1910——*Calamintha clinopodium* Benth. var. *pratensis* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:159. 1915——*Calamintha clinopodium* Benth. var. *umbrosa* sensu Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:159. 1915, quoad syn. p. p., non Hook. f. in Thwaites, Enum. 239. 1864——*Calamintha clinopodium* Benth. var. *polycephala* (Vaniot) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:160. 1915——*Calamintha clinopodium* Benth. var. *nepalensis* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:160. 1915, excl. syn.——*Satureia chinensis* Briq. var. *α. parviflora* Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:103. 1929, p. p. maj.——*Clinopodium chinense* ssp. *grandiflorum* var. *parviflorum* (Kudo) Hara in Journ. Jap. Bot. **12**:39. 1936, p. p. quoad syn. *Calamintha polycephala* Vaniot——*Calamintha umbrosa* auct. non (Bieb.) Benth.: Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **7**:44, 313. 1912, quoad Forrest 584.

直立多年生草本，高0.5—1米，多分枝，基部有时匍匐生根。茎四棱形，具槽，被平展糙硬毛及腺毛。叶卵形，长2—5厘米，宽1.5—3.2厘米，先端钝或急尖，基部阔楔形至几圆形，边缘具疏圆齿状牙齿，上面榄绿色，下面略淡，两面被糙硬毛，尤其是下面脉上，侧脉约5对，与中脉在上面微下陷下面明显隆起。轮伞花序多花，圆球状，花时径达2厘米，沿茎及分枝形成宽而多头的圆锥花序；苞叶叶状，较小，生于茎及分枝近顶部者退化成苞片状；苞片针状，长3—5毫米，被具节长柔毛及腺柔毛；花梗长2—5毫米，密被腺柔毛。花萼圆筒形，花时长约6毫米，宽约1毫米，具13脉，脉上被具节长柔毛及腺微柔毛，萼内喉部具疏刚毛，果时基部一边膨胀，宽至2毫米，上唇3齿，齿三角形，具尾尖，下唇2齿，先端芒尖。花冠紫红色，长约8毫米，冠筒伸出于花萼，外面被微柔毛，冠檐二唇形，上唇直伸，先端微缺，下唇3裂。雄蕊不露出，后对雄蕊短且花药小，在上唇穹隆下，直伸，前雄蕊长超过下唇，花药正常。花盘平顶。子房无毛。小坚果卵形，长约1毫米，褐色，光滑。花期7—8月，果期9月。

产陕西，甘肃，山西，河北，河南，山东，浙江，江苏，安徽，福建，江西，湖南，湖北，广西，贵州，四川，云南及西藏东部；生于山坡、路边、林下、灌丛中，海拔至3400米。模式标本采自贵州。

民间用全草入药，治功能性子宫出血、胆囊炎、黄胆型肝炎、感冒头痛、腹痛、小儿疳积、火眼、跌打损伤、疮疮、皮肤疮疡、蛇及狂犬咬伤、烂脚丫、烂头疔及痔疮等症。