

端微缺,下唇3裂。雄蕊及雌蕊均内藏。小坚果近球形,直径约0.8毫米,褐色。花期6—9月,果期10—12月。

产甘肃,陕西,湖北,湖南,江西,江苏,浙江,福建,台湾,江西,四川,贵州及云南;生于山坡、草地、林下、路边、沟边等处,海拔可高达3300米。尼泊尔,不丹,印度,斯里兰卡,缅甸,印度尼西亚,菲律宾,日本也有。模式标本采自尼泊尔。

3. 长梗风轮菜

Clinopodium longipes C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):199. pl. 55. 1974.

多年生草本。茎高约20厘米,基部常匍匐生根,上部上升,钝四棱形,常染紫红色,被向下的疏柔毛。叶匙形,长1—2.5厘米,宽7—10毫米,先端急尖或钝,基部楔形,边缘在上半部具2—6圆齿状锯齿,纸质,上面榄绿色,疏被短硬毛,下面色淡,被稀疏平展纤毛,侧脉3—4对,与中脉在上面微凹陷下面显著;叶柄长2—3毫米,扁平,密被短硬毛。轮伞花序2—8花,花后宽1.5厘米,生于茎、枝上部,彼此稍靠近;苞叶叶状,向上渐小至呈苞片状;苞片针状,长2—2.5毫米,均短于花梗,具肋,扁平,具白色缘毛及腺微柔毛;总梗长1—2毫米,分枝几集中一点,密被腺短柔毛;花梗长3—5毫米,毛被同总梗。花萼花后管状钟形,长约5毫米,宽约2毫米,常染紫红色,13脉,外面沿脉上疏被白色纤毛,内面在喉部疏被白色纤毛,基部微一边膨胀,上唇3齿,齿外反,三角形,先端具胼胝尖,下唇2齿,齿直伸,先端芒尖。花冠未开时几不伸出花萼,外面被微柔毛。雄蕊及雌蕊内藏,小坚果近球形,直径约0.9毫米,黄褐色。果期11月。

产四川中部;生于溪旁。模式标本采自四川洪雅。

4. 风轮菜(救荒本草) 野凉粉藤(草)(广西桂林),苦刀草(广西阳朔),九层塔(广西柳江),山薄荷(江西寻乌),野薄荷(广东梅县) 图版52

Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. **2**:515. 1891; Makino in Bot. Mag. Tokyo **20**:3. 1906; Matsum. Ind. Pl. Jap. **2**(2):538 1912; Hara in Journ. Jap. Bot. **12**:38. 1936, excl. ssp., f. 27; Ohwi, Fl. Jap. 1015. 1956; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):201. 1974——*Calamintha chinensis* Benth. in DC. Prodr. **12**:233. 1848; Hance in Ann. Sci. Nat. V. Bot. **5**:235. 1866; Franch. et Sav.

图版52: 风轮菜 **Clinopodium chinense** (Benth.) O. Ktze., 1. 植株的下部及上部; 2. 花, 侧面观, 兼示小苞片; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雌蕊。(曾孝濂绘)