

中肋在上面微凹陷下面明显隆起;下部叶叶柄较长,长1—1.2厘米,向上渐短,长约2—5毫米,腹凹背凸,密被具节疏柔毛。轮伞花序多花密集,半球形,位于下部者径达3厘米,上部者径约2厘米,彼此远隔;苞叶叶状,下部者超出轮伞花序,上部者与轮伞花序等长,且呈苞片状;苞片线形,常染紫红色,明显具肋,为花萼长 $2/3-3/4$,被白色缘毛;总梗长3—5毫米,分枝多数;花梗长1.5—2.5毫米,与总梗及序轴密被腺微柔毛。花萼狭管状,长约8毫米,上部染紫红色,13脉,外面主要沿脉上被白色纤毛,余部被腺微柔毛,内面在齿上疏被疏柔毛,果时基部稍一边膨胀,上唇3齿,齿近外反,长三角形,先端具短芒尖,下唇2齿,齿直伸,稍长,先端芒尖。花冠紫红色,长约1.2厘米,外被微柔毛,内面在下唇下方喉部具二列毛茸,冠筒伸出,基部宽1毫米,自基部 $1/3$ 向上渐宽大,至喉部宽约3毫米,冠檐二唇形,上唇直伸,先端微缺,下唇3裂,中裂片稍大。雄蕊4,前对稍长,几不露出或微露出,花药2室,室略叉开。花柱微露出,先端不相等2浅裂,裂片扁平。花盘平顶。子房无毛。小坚果倒卵形,长约1毫米,宽约0.8毫米,褐色,无毛。花期6—8月,果期8—10月。

产黑龙江,辽宁,吉林,河北,河南,山西,陕西,四川西北部,山东及江苏;生于山坡、草地、路旁、林下,海拔300—2240米。朝鲜,苏联远东地区也有。模式标本采自我国东北(?)。

6. 寸金草(云南昆明) 麻布草、山夏枯草(云南昆明),灯笼花(云南维西),蛇床子、土白芷、莲台夏枯草(云南曲靖),盐烟苏(四川会东)

Clinopodium megalanthum (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):202. 1974——*Calamintha chinensis* Benth. var. *megalantha* Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**:233. 1912; in *ibid.* **7**:134, 313, 344. 1912—13——*Calamintha clinopodium* Benth. var. *megalantha* (Diels) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:159. 1915——*Calamintha clinopodium* Benth. var. *typica* Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:158. 1915, p. p. quoad specim. Monbeig 214, excl. syn.——*Satureia chinensis* Briq. var. β . *megalantha* Kudo in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **43** (8):39. 1921; et in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:103. 1929, excl. syn. p. p.——*Calamintha megalantha* (Diels) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. **9**:84. 1934; Symb. Sin. **7**:931. 1936——*Satureia chinensis* auct. non (O. Ktze.) Briq.: Diels in

图版 53: 寸金草(原变种) **Clinopodium megalanthum** (Diels) C. Y. Wu et Hsuan var. **megalanthum**, 1. 植株的下部及上部; 2. 花, 侧面观, 兼示小苞片; 3. 花萼纵剖, 内面观; 4. 花冠纵剖, 内面观, 兼示雄蕊; 5. 雌蕊。(曾孝濂绘)

Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**:479. 1922, quoad Limpricht 1059, fide Hand.-Mazz.

6a. 寸金草(原变种) 图版 53

var. **megalanthum**

多年生草本。茎多数,自根茎生出,高可达 60 厘米,基部匍匐生根,简单或分枝,四棱形,具浅槽,常染紫红色,极密被白色平展刚毛,下部较疏,节间伸长,比叶片长很多。叶三角状卵圆形,长 1.2—2 厘米,宽 1—1.7 厘米,先端钝或锐尖,基部圆形或近浅心形,边缘为圆齿状锯齿,上面榄绿色,被白色纤毛,近边缘较密,下面较淡,主沿各级脉上被白色纤毛,余部有不明显小凹腺点,侧脉 4—5 对,与中脉在上面微凹陷或近平坦,下面带紫红色,明显隆起;叶柄极短,长 1—3 毫米,常带紫红色,密被白色平展刚毛。轮伞花序多花密集,半球形,花时连花冠径达 3.5 厘米,生于茎、枝顶部,向上聚集;苞叶叶状,下部的略超出花萼,向上渐变小,呈苞片状,苞片针状,具肋,与花萼等长或略短,被白色平展缘毛及微小腺点,先端染紫红色。花萼圆筒状,开花时长约 9 毫米,13 脉,外面主要沿脉上被白色刚毛,余部满布微小腺点,内面在喉部以上被白色疏柔毛,果时基部稍一边膨胀,上唇 3 齿,齿长三角形,多少外反,先端短芒尖,下唇 2 齿,齿与上唇近等长,三角形,先端长芒尖。花冠粉红色,较大,长 1.5—2 厘米,外面被微柔毛,内面在下唇下方具二列柔毛,冠筒十分伸出,基部宽 1.5 毫米,自伸出部分向上渐扩大,至喉部宽达 5 毫米,冠檐二唇形,上唇直伸,先端微缺,下唇 3 裂,中裂片较大。雄蕊 4,前对较长,均延伸至上唇下,几不超出,花药卵圆形,2 室,室略叉开。花柱微超出上唇片,先端不相等 2 浅裂,裂片扁平。花盘平顶。子房无毛。小坚果倒卵形,长约 1 毫米,宽约 0.9 毫米,褐色,无毛。花期 7—9 月,果期 8—11 月。

产云南,四川南部及西南部,湖北西南部及贵州北部;生于山坡、草地、路旁、灌丛中及林下,海拔 1300—3200 米。模式标本采自云南丽江。

云南用全草入药,治牙痛、小儿疳积、风湿跌打、消肿活血,煎水服可退烧,其籽可壮阳。

6b. 粗壮变种

var. **robustum** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2): 203. 1974.

这一变种与原变种不同在于植株粗壮,分枝多数;叶大,长达 5 厘米,宽达 4 厘米,叶柄长 4—5 毫米;花大,长约 1.8 厘米。

产云南西北部;生于路旁,海拔 2500 米。模式标本采自云南洱源。