

6c. 美丽变种

var. **speciosum** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2): 203. 1974.

这一变种与原变种不同在于植株矮小, 高约 10—15 厘米; 叶卵状长圆形至卵状披针形, 长 0.8—2 厘米, 宽 0.4—1.1 厘米; 轮伞花序生于茎的上部, 花紫色, 长约 1.5 厘米。

产云南西北部; 生于山坡上, 海拔 3200 米。模式标本采自云南维西。

6d. 居间变种

var. **intermedium** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):203. 1974.

这一变种与原变种不同在于叶卵圆形, 长 1—2.2 厘米, 宽 0.8—1.2 厘米, 叶柄长 2—3 毫米; 植株毛较少。

产云南西北部; 生于山坡、谷地、灌丛、砾石草地, 海拔 2300—3200 米。模式标本采自云南维西。

6e. 披针叶变种

var. **lancifolium** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):203. 1974.

这一变种与原变种不同在于茎多分枝, 密被向下短柔毛及微柔毛; 叶披针形, 长 2—3.8 厘米, 宽 0.7—1.6 厘米, 上面被极疏短硬毛, 下面脉上被贴生短硬毛; 苞片比萼略短。

产云南西部; 生于山坡上, 海拔约 2800 米。模式标本采自云南宾川。

可分二变型: 一为**原变型** f. **lancifolium**; 一为**近无毛变型** f. **subglabrum** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):203. 1974. 后一变型与前一变型不同在于茎与叶近无毛, 叶具锯齿, 苞片与花萼几等长, 产云南西北部, 生于山地, 海拔约 2900 米, 模式标本采自云南丽江白水河坡地上。

7. 异色风轮菜

Clinopodium discolor (Diels) C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):203. 1974——*Calamintha discolor* Diels in Notes Bot. Gard. Edinburgh **5**:232. 1912; in *ibid.* **7**:245, 313, 344. 1912—13; Hand. Mazz. in Act. Hort. Göthob. **9**:84. 1934, in nota; Symb. Sin. **7**:931. 1936, descr. add.——*Calamintha clinopodium* Linn. var. *discolor* (Diels) Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **6**:159.