

式标本采自日本九州中部。

10. 邻近风轮菜 四季草(四川筠连), 迴文草(湖南岳麓山)

Clinopodium confine (Hance) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 2:514. 1891; Ohwi. Fl. Jap. 1016. 1956; H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2):205. 1974——*Calamintha confinis* Hance in Journ. Brit. & For. **6**:331. 1868; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot **26**:283. 1890——*Satureia confinis* (Hance) Kudo, in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**:100. 1929.

10a. 邻近风轮菜(原变种) 图版 54: 7—8

var. **confine**

草本, 铺散, 基部生根。茎四棱形, 无毛或疏被微柔毛。叶卵圆形, 长 8—22 毫米, 宽 5—17 毫米, 先端钝, 基部圆形或阔楔形, 边缘自近基部以上具圆齿状锯齿, 每侧 5—7 齿, 薄纸质, 两面均无毛, 侧脉 3—4 对, 与中脉两面均明显, 叶柄长 2—10 毫米, 腹平背凸, 疏被微柔毛。轮伞花序通常多花密集, 近球形, 径达 1—1.3 厘米, 分离: 苞叶叶状; 苞片极小; 花梗长 1—2 毫米, 被微柔毛。花萼管状, 萼筒等宽, 基部略狭, 花时长约 5 毫米, 果时略增大, 外面全无毛或沿脉上有极稀少的毛, 内面喉部被小疏柔毛, 上唇 3 齿, 三角形, 下唇 2 齿, 长三角形, 略伸长, 齿边缘均被睫毛。花冠粉红至紫红色, 稍超出花萼, 长约 4 毫米, 外面被微柔毛, 内面在下唇片下方略被毛或近无毛, 冠筒向上渐扩大, 至喉部宽 1.2 毫米, 冠檐二唇形, 上唇直伸, 长 0.6 毫米, 先端微缺, 下唇上唇等长, 3 裂, 中裂片较大, 先端微缺。雄蕊 4, 内藏, 前对能育, 后对退化, 花药 2 室, 室略叉开。花柱先端略增粗, 2 浅裂, 裂片扁平。花盘平顶。子房无毛。小坚果卵球形, 长 0.8 毫米, 褐色, 光滑。 花期 4—6 月, 果期 7—8 月。

产浙江, 江苏, 安徽, 河南南部, 江西, 福建, 广东, 湖南, 广西, 贵州及四川; 生于田边、山坡、草地, 海拔约在 500 米以下。日本也有。模式标本采自广东南海县西樵山。

10b. 球花变种 图版 54: 9

var. **globosum** C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. **12**(2): 205. 1974.

这一变种与原变种不同在于叶大, 近圆形, 长 1—3 厘米, 宽 1—2.5 厘米; 轮伞花序极多花密集, 球形, 径 1.5—1.8 厘米。

产浙江。模式标本采自浙江龙泉。

11. 峨眉风轮菜 图版 54: 10

Clinopodium omeiense C. Y. Wu et Hsuan ex H. W. Li in Act. Phytotax.